

# Уход за маисовым полозом

## Маисовый полоз

### Особенности вида

Активная лазающая змея; легко проходит в небольшие щели.

### Размер

При вылуплении 20–35 см; взрослые самцы 90–150 см, самки 90–150 см.

### Продолжительность жизни

15–25 лет.

### Активность и режим дня

Преимущественно сумеречный и ночной; весной и осенью может быть активен днём.

### Ареал обитания

Восток и юго-восток США; леса, поля, каменистые склоны и сельскохозяйственные постройки умеренного и субтропического климата.

### Террариум

Пластик или стекло, горизонтальный. Для змей длиной до 1 м минимально допустимый размер – 60 × 45 × 45 см, комфортный – от 90 × 45 × 45 см. После достижения 1 м минимально допустимый размер – 90 × 45 × 55 см, комфортный – от 120 × 60 × 60 см. Дверцы и крышка должны закрываться на замок; щели и вентиляционные отверстия должны быть уже головы змеи. Вентиляцию размещают на двух противоположных стенках: приток внизу с прохладной стороны, выход воздуха вверх с тёплой. Молодь можно содержать в меньшем контейнере и менять его по мере роста либо сразу заселить в указанный объём, заполнив его укрытиями и растениями.

### Оборудование террариума

- Террариум подходящего по длине змеи размера и замок;
- Термоковрик размером 25–33% площади дна и термостат с выносным датчиком;
- Для большого или толстостенного террариума вместо коврика – керамический нагреватель без света, защитная сетка и совместимый термостат;
- Два цифровых термометра и цифровой гигрометр;
- Два обычных укрытия и влажная камера;
- Субстрат, устойчивая поилка-купалка и закреплённые ветви.

### Субстрат

Для постоянного содержания – обеспыленная осиновая или тополевая стружка либо волокно, включая лигноцел, кокосовые чипсы или кипарисовая мульча слоем 5–8 см. Кокосовые чипсы используют слегка влажными, но не мокрыми; на них корм дают щипцами, не роняя мышь на субстрат. Кокосовое волокно допустимо в составе почвенной смеси без удобрений или во влажной камере, но не в виде пыльного сухого слоя. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик без петель допустимы на карантине и при лечении; загрязнённую подстилку заменяют сразу, для коврика нужен второй сменный комплект. Буковую щепу не использовать как основной субстрат: она плохо подходит для рытья и может быть проглочена вместе с кормом. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель, чистый и кальциевый песок запрещены.

### Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия – в тёплой и прохладной зоне; отдельная влажная камера; устойчивые ветви и шероховатые предметы.

### Активность и обогащение среды

Лазательные ветви, тоннели, листовой опад и периодическая смена безопасных запаховых объектов.

### Поилка

Тяжёлая устойчивая ёмкость со свежей водой; размер позволяет свернуться и полностью погрузить тело.

### Температура и обогрев

Тёплая зона 28–30 °C, прохладная 22–25 °C, ночью 20–24 °C. Для нижнего обогрева термоковрик закрепляют снаружи под тёплым краем террариума; он должен занимать четверть или треть площади дна. Коврик подключают к термостату, а его датчик надёжно закрепляют внутри на дне над центром коврика так, чтобы змея не могла сдвинуть датчик. Температуру проверяют отдельными цифровыми термометрами в тёплой и прохладной зонах. В толстостенном террариуме используют керамический нагреватель без света: его устанавливают сверху только за защитной сеткой и подключают к термостату. Греющий камень запрещён.

## Влажность

40–60%; измерять цифровым гигрометром в средней части прохладной половины. Если показатель опустился ниже 40%, увлажнить мох или сложенную бумажную салфетку во влажной камере; осиновою и тополевою стружку не опрыскивать. Прекратить увлажнение после возвращения показателя в диапазон; поверхность большей части грунта должна высохнуть, постоянная сырость и конденсат недопустимы. Во влажной камере во время линьки поддерживать 70–80%. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

## Освещение и световой день

Рассеянный свет помещения обеспечивает цикл 12 часов света и 12 часов полной темноты; ночью террариум не подсвечивают.

## Рацион и кормление

Размороженные мыши или крысы. До 100 г: корм 10–15% массы змеи каждые 5–7 дней; 100–300 г: 8–12% каждые 7–10 дней; более 300 г: 5–10% каждые 10–14 дней. Кормовой объект не шире 1–1,5 самой широкой части тела. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

## Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны; питательные вещества поступают из цельного кормового объекта.

## Вода

Воду менять ежедневно и сразу после загрязнения; плановое купание не требуется.

## Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полную уборку выполнять каждые 4 недели и после заболевания.

## Контакт и безопасность

Поддерживать тело двумя руками; не брать 48 часов после кормления, во время линьки и при защитной позе.

## Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

## Сезонные изменения и покой

Обязательная зимовка не нужна; охлаждение допускается только по программе разведения и под ветеринарным контролем.

## Карантин и подселение

Карантин новой змеи не менее 90 дней в отдельном помещении и с отдельным инвентарём; постоянное совместное содержание не допускается.

## Безопасность и особые риски

Контролировать замок и отверстия после каждого обслуживания; соблюдать гигиену из-за риска Salmonella.

## Тревожные признаки

Дыхание с открытым ртом, выделения, пузыри, стойкий отказ от корма с потерей массы, рвота, диарея, клещи, ожог, неполная линька или вялость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Kubiak M. "Corn Snakes", Handbook of Exotic Pet Medicine, 2020, гл. 16 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Divers S. J., Stahl S. J., eds. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Girling S. J., Raiti P., eds. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Warwick C. et al., eds. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. RSPCA, Corn snake care sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. ReptiFiles, Corn Snake Care Guide, ред. 30.05.2024. - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Маисовый полоз · версия 6