

Уход за тегу

Тегу

Особенности вида

Крупная умная роющая ящерица; способна к сезонной эндотермии в период размножения.

Размер

При вылуплении 20–30 см; взрослые самцы 120–140 см, самки 90–120 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Дневной.

Ареал обитания

Аргентина, Парагвай, Уругвай и юг Бразилии; саванны, лесные опушки и сезонно-влажные территории.

Террариум

Влагостойкие панели, промышленный пластик или стекло в металлической раме, горизонтальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 240 × 120 × 120 см, комфортный – от 300 × 150 × 150 см. Двери закрываются на замок; щели, открытые кабели и доступные края облицовки недопустимы. Приток воздуха располагают внизу прохладной стороны, вытяжку – вверх; тёплой; вентиляция не должна пересушивать нижний слой грунта. Молодь быстро растёт и может сразу жить во взрослом объёме, если он густо оформлен укрытиями.

Оборудование террариума

- Прочное помещение или террариум выбранного размера и замок;
- Несколько широких галогенных ламп, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Две линейные T5 UVB-лампы высокой мощности с отражателями и целевым UVI 3,0–4,0;
- Яркий светильник 6000–7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Напорный опрыскиватель;
- Субстрат глубиной 30–45 см, два прочных укрытия, брёвна и площадка прогрева;
- Тяжёлый бассейн, нескользкий вход и слив;
- Кормовые щипцы, кальций и мультивитамин для рептилий;
- Закрывающийся транспортный контейнер.

Субстрат

30–45 см смеси из 50% органической почвы без удобрений, 30% кокосового волокна и 20% кокосовых чипсов либо кипарисовой мульчи. Нижний слой увлажняют так, чтобы вырытая нора сохраняла форму, но при сжатии грунта из него не текла вода; поверхность оставляют более сухой. Бумажные листы и цельный нескользкий пластиковый коврик подходят только для карантина или лечения, когда рытьё временно ограничено. Осина, тополь, лигноцел и буковая щепка не удерживают тоннели и не подходят для основного слоя. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Два крупных укрытия, глубокая нора, закреплённые брёвна и платформа прогрева.

Активность и обогащение среды

Ежедневный поиск корма, рытьё, бассейн, запаховые задания и тренировка добровольного перехода.

Поилка

Тяжёлый бассейн для полного погружения с нескользким входом.

Температура и обогрев

Поверхность площадки прогрева 43–50 °C, воздух в тёплой зоне 30–35 °C, в прохладной 24–28 °C, ночью 20–23 °C. Несколько ламп размещают рядом, чтобы прогревалось всё тело; их закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату. Поверхность проверяют инфракрасным термометром в нескольких точках, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

60–80% в воздухе, 80–90% в норе; измерять отдельными гигрометрами у прохладной зоны и внутри укрытия. Если воздух опустился ниже 60%, опрыскать прохладную половину и небольшими порциями влить воду в углы, перемешивая только нижний слой грунта. Прекратить после возвращения показателя в диапазон. Нора должна сохранять форму, но не быть заболоченной; мокрая поверхность, лужи и кислый запах означают переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Линейные T5 UVB-лампы и яркий дневной свет включать на 12–14 часов. Вся площадка прогрева должна получать UVI 3,0–4,0, укрытия – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Молодь 70% цельной животной пищи и насекомых, 20% овощей, 10% фруктов ежедневно; взрослые 50% животной пищи, 40% овощей и зелени, 10% фруктов 3–4 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Насекомых помещают в закрывающуюся ёмкость, добавляют щепотку кальция без D3 и осторожно встряхивают до тонкого покрытия; затем сразу скармливают. Мультивитамин используют вместо кальция один раз в неделю у молоди и дважды в месяц у взрослых, соблюдая дозировку препарата. Полнорационные цельные кормовые объекты дополнительно не обсыпают.

Вода

Вода и бассейн постоянно; менять ежедневно и после загрязнения.

Уборка

Остатки корма через 4 часа, помёт сразу, бассейн после загрязнения, полная уборка по участкам ежемесячно.

Контакт и безопасность

Взаимодействовать на полу, не поднимать за хвост; взрослую особь обслуживать вдвоём при возбуждении.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Здоровые взрослые могут уходить в покой; температуру и кормление снижают только после устойчивого самостоятельного отказа от пищи и осмотра.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Сильный укус, удар хвостом, рывок и ожирение.

Тревожные признаки

Мягкая челюсть, слабость конечностей, опухшие суставы, потеря массы, рвота, диарея, одышка или длительный отказ от прогрева вне покоя.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Argentine Tegu Care Sheet, 2020 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. ReptiNode, Salvator merianae Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Herpeton Academy, Argentine Black and White Tegu, ред. 2026 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Goetz S. M. et al., Argentine Black and White Tegu can survive the winter under semi-natural conditions, 2021 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Baines et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
8. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
9. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Tegu · версия 4