

Уход за австралийской квакшей

Австралийская квакша

Особенности вида

Крупная древесная квакша с восковым секретом кожи; легко набирает лишний вес.

Размер

После метаморфоза 1,5–2,5 см; взрослые самцы 7–10 см, самки 9–12 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Сумеречный и ночной, древесный.

Ареал обитания

Север и восток Австралии и юг Новой Гвинеи; влажные леса, саванны и сезонно-сухие районы.

Террариум

Стекланный или пластиковый, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 45 × 45 × 60 см, комфортный – от 60 × 45 × 90 см. Дверца и крышка закрываются на фиксаторы, щели недопустимы. Нижние передние и верхние сетчатые отверстия создают движение воздуха снизу вверх; лампы устанавливают снаружи.

Оборудование террариума

- Вертикальный террариум выбранного размера с фиксаторами;
- Белая дневная греющая лампа малой мощности с диммирующим термостатом;
- Линейная UVB-лампа низкой мощности с отражателем и таймером;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Помповый пульверизатор и кондиционер от хлора и хлорамина;
- Дренаж, субстрат, толстые ветви, полые трубки и крупнолистные растения;
- Тяжёлая поилка, кормовые щипцы, кальций и мультивитамины.

Субстрат

8–12 см смеси грунта без удобрений и кокосового волокна над дренажом, сверху лиственный опад. Кокосовые чипсы и мелкая безопасная кора допустимы как часть смеси. Бумажные салфетки используют в карантине. Цельный пластиковый коврик допустим только временно с отдельной влажной камерой; волокна осины или тополя и буковая щепа не подходят для влажного террариума. Гравий, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Крупнолистные растения, полые трубки, минимум два закрытых участка и толстые ветви.

Активность и обогащение среды

Непрерывные маршруты по высоте и кормовые точки на разных уровнях.

Поилка

Тяжёлая ёмкость с пологим выходом, позволяющая сидеть в воде.

Температура и обогрев

Поверхность верхней ветви 28–30 °C, воздух наверху 25–28 °C, внизу 22–24 °C, ночью 18–22 °C. Белую лампу ставят над одной стороной крыши и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на ветви на высоте тела.

Влажность

Днём 50–60%, после вечернего опрыскивания 70–80%. Вечером пульверизатором смочить листья, стенки и прохладную часть грунта дехлорированной водой до 75–80%; утром повторить только при показании ниже 50%. Листья и верх грунта должны частично высохнуть днём. Постоянный конденсат, мокрый грунт и затхлый запах означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов; UVB с UVI 1,0–2,0 на верхней ветви.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, саранча и дождевые черви; молодь ежедневно, взрослые 2–3 раза в неделю по 3–6 насекомых. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Насекомых при большинстве кормлений поместить в закрывающуюся ёмкость с щепоткой кальция без D3, встряхнуть до тонкого покрытия и сразу скормить. Кальций с D3 и мультивитамин использовать по отдельности вместо обычного кальция дважды в месяц каждый. Выбирать мультивитамин для амфибий с готовой формой витамина А (ретинила ацетат или пальмитат). Дозировку и частоту определять по составу и инструкции; отдельный витамин А без назначения ветеринара не давать.

Вода

Дехлорированная вода постоянно, менять ежедневно; купание добровольное.

Уборка

Помёт и погибший корм ежедневно; поилку ежедневно; поверхности еженедельно.

Контакт и безопасность

Руками не брать; при необходимости – влажные перчатки без пудры.

Линька

Лягушка регулярно сбрасывает очень тонкий наружный слой кожи и обычно сразу съедает его, поэтому процесс часто остаётся незаметным; это нормально. Иногда животное выгибается и проводит лапами по телу, помогая коже сойти. Кожу не снимают руками. Длительное отслаивание, покраснение, язвы или вялость требуют проверки условий содержания и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна.

Карантин и подселение

Минимум 60 дней отдельно с тестом на хитридиомикоз; постоянное одиночное содержание.

Безопасность и особые риски

Ожирение, падение, хлор и остатки моющих средств.

Тревожные признаки

Покраснение кожи, закрытые глаза, потеря веса, отёк, слабый хват, судороги или дневная вялость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Amphibian Medicine and Captive Husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. AZA Amphibian Husbandry Resource Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. AmphibiaWeb, Ranoidea caerulea - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Carpenter's Exotic Animal Formulary, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. EAZA Agalychnis moreletii BPG, 2022, применимые нормы древесных лягушек. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Австралийская квакша · версия 4