

Уход за тигровым питоном

Тигровый питон

Особенности вида

Очень крупный тяжёлый питон; хорошо плавает и требует защищённого обслуживания.

Размер

При вылуплении 50-70 см; взрослые самцы 250-400 см, самки 350-500 см и более.

Продолжительность жизни

20-25 лет.

Активность и режим дня

Сумеречный и ночной; может греться днём.

Ареал обитания

Южная и Юго-Восточная Азия; влажные леса, саванны, болота и речные долины тропического муссонного климата.

Террариум

Отдельное помещение из влагостойких панелей, промышленного пластика или армированного стекла в металлической раме. Для змеи длиной от 3 м минимально допустимые длина, ширина и высота составляют 2/3, 1/2 и 1/2 длины тела; высота ограничивается 2,2 м. Комфортная длина равна полной длине змеи, ширина – не меньше половины длины. Для особи 4 м минимум – 270 × 200 × 200 см, комфортный размер – от 400 × 200 × 200 см. Вход выполняют через защищённый тамбур; двери имеют два независимых замка. Щели недопустимы. Приточные металлические решётки располагают внизу прохладной стороны, вытяжные – сверху тёплой; решётки и светильники должны выдерживать давление змеи.

Оборудование террариума

- Помещение рассчитанного по длине змеи размера, защищённый тамбур и два замка;
- Верхние лучистые панели или несколько широких галогенных ламп, защитные решётки, основной и аварийный термостаты, сигнализация выхода температуры за диапазон;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Ручной напорный опрыскиватель для молодёжного объёма либо автоматическая дождевальная система с гигростатом для взрослого помещения;
- Два прочных укрытия, закрываемых снаружи, и изолируемый транспортный контейнер;
- Влагоёмкий субстрат или моющийся нескользкий пол со сменными грунтовыми секциями;
- Стационарный бассейн со сливом и нескользким входом;
- Закреплённые брёвна, полки, растения или визуальные барьеры;
- Дневной светильник и таймер.

Субстрат

Слой не менее 10 см из кокосовых чипсов, кипарисовой мульчи либо смеси 40% почвы без удобрений, 40% кокосового волокна и 20% промытого песка. Для крупной особи допустим герметичный нескользкий моющийся пол с несколькими закреплёнными грунтовыми секциями. Бумажные листы используют в карантине. Цельные пластиковые или резиновые коврики подходят только без петель, щелей и доступных краёв; нужен сменный комплект для полного мытья и высушивания. Осина, тополь, лигноцел и буковая щепка быстро намокают при требуемой влажности и не подходят для постоянного слоя. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два прочных укрытия, закрывающихся снаружи; закреплённые брёвна, полки и визуальные барьеры.

Активность и обогащение среды

Бассейн, разные фактуры пола, запаховые следы, смена маршрутов и тренировка добровольного перехода в транспортный контейнер.

Поилка

Стационарный бассейн для полного погружения; нескользкий вход и слив обязательны.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 32-34 °C, воздух в прохладной зоне 26-29 °C, ночью 24-27 °C. Верхний нагрев должен прогревать всё свернувшееся тело, а не одну небольшую точку. Основной термостат регулирует рабочую температуру, аварийный отключает систему при перегреве; датчики закрепляют вне доступа змеи на высоте её тела. Показания сверяют с независимыми термометрами. Термоковрики не обогревают взрослое помещение; греющие камни запрещены из-за риска ожога.

Влажность

55–70%; измерять двумя цифровыми гигрометрами в средней части помещения и у прохладного укрытия. Если показатель опустился ниже 55%, опрыскать стены и прохладную часть грунта напорным опрыскивателем либо включить дождевальную систему через гигростат до возвращения показателя в диапазон. Между циклами поверхность должна подсыхать. Постоянный конденсат, лужи и затхлый запах означают переувлажнение. Резервуар, форсунки и трубки автоматической системы мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Дневной светильник включать таймером на 12 часов; следующие 12 часов обеспечивать полную темноту. Все светильники закрывать прочной металлической решёткой.

Рацион и кормление

Заранее умерщвлённые цельные грызуны, кролики и птица. До 5 кг: 7–10% массы каждые 10–14 дней; 5–20 кг: 5–7% каждые 14–21 день; более 20 кг: 3–5% каждые 21–35 дней. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при разнообразных цельных кормовых объектах.

Вода

Питьевая вода и бассейн доступны постоянно; воду менять ежедневно и после загрязнения.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; бассейн мыть после каждого загрязнения; полная санитарная обработка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

До 2 м работает один подготовленный человек; выше 2 м – минимум двое. Не размещать змею на шее и не входить в предел кормового броска.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; сезонные изменения используют только при разведении.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней в отдельном блоке с отдельным инвентарём; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Крупная особь опасна укусом и сдавливанием; перед открытием террариума отделять кормовой контекст и держать второго сотрудника рядом.

Тревожные признаки

Дыхательные шумы, выделения, отказ от корма с потерей массы, рвота, ожог, клещи, повреждение рта, пролапс или нарушение координации.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Burmese Python Care Sheet, ред. 03.2024 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Chicago Exotics Animal Hospital, Burmese Python Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Washington M., Observations on the husbandry, breeding and behaviour of the Indian python, International Zoo Yearbook 38, 2003 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Тигровый питон · версия 5