

Уход за калифорнийской королевской змеей

Калифорнийская королевская змея

Особенности вида

Активно охотится на других змей; кормовой рефлекс выражен сильно.

Размер

При вылуплении 20–30 см; взрослые самцы 90–120 см, самки 100–140 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Весной чаще дневной, летом преимущественно сумеречный и ночной.

Ареал обитания

Запад США и северо-запад Мексики; леса, кустарники, луга, пустыни и сельскохозяйственные территории с выраженной сезонностью.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтальный. Для змей длиной до 1 м минимально допустимый размер – 60 × 45 × 45 см, комфортный – от 90 × 45 × 45 см. После достижения 1 м минимально допустимый размер – 90 × 45 × 55 см, комфортный – от 120 × 60 × 60 см. Дверцы и крышка закрываются на замок; щели и вентиляционные отверстия должны быть уже головы змеи. Приток воздуха располагают внизу прохладной стороны, выход – вверх тёплой. Молодь можно растить в меньшем контейнере с заменой по мере роста либо в указанном объёме с большим количеством укрытий и визуальных заслонов.

Оборудование террариума

- Террариум подходящего по длине змеи размера и замок;
- Верхняя греющая лампа мощностью 50–90 Вт, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два тесных укрытия и влажная камера;
- Субстрат, тяжёлая поилка-купалка, ветви, кора и тоннели;
- Таймер для дневного светового режима;
- Для маленького контейнера вместо лампы – термоковрик размером 25–33% площади дна и отдельный термостат.

Субстрат

Постоянный рыхлый слой 8–10 см из обеспыленной осиновой или тополевой стружки/волока, почвенной смеси без удобрений либо смеси почвы и кокосового волокна. Кокосовые чипсы допустимы в смеси, если влажность не превышает установленный диапазон и поверхность остаётся сухой. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик без петель допустимы на карантине, при лечении и для молоди во время наблюдения; для коврика нужны два сменных комплекта. Буковая щепа не используется как основной слой: она хуже подходит для тоннелей и может быть проглочена с кормом. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель, чистый и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия, влажная камера на период линьки, устойчивые ветви, кора и тоннели.

Активность и обогащение среды

Глубокий рыхлый слой для зарывания, лазательные элементы и сменяемые запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая устойчивая ёмкость со свежей водой; размер позволяет свернуться и погрузить тело.

Температура и обогрев

Поверхность обогрева 28–30 °С, воздух в прохладной зоне 21–24 °С, ночью 18–22 °С. Греющую лампу устанавливают над одним краем террариума, закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату. Датчик закрепляют на высоте тела змеи в зоне обогрева; воздух проверяют двумя цифровыми термометрами, поверхность – инфракрасным. В маленьком контейнере термоковрик крепят снаружи под тёплым краем на четверть или треть площади дна и подключают к отдельному термостату. Греющий камень запрещён.

Влажность

40–60%; измерять цифровым гигрометром в средней части прохладной половины. При показателе ниже 40% слегка опрыскать чистой водой только прохладный угол и увлажнить сфагнум или сложенную бумажную салфетку во влажной камере. Прекратить после возвращения влажности в диапазон; большая часть поверхности должна оставаться сухой, без конденсата. Во влажной камере во время линьки поддерживать 70–80%. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Дневной светильник или рассеянный свет помещения обеспечивает 12 часов света; ночью террариум оставляют в темноте на 12 часов.

Рацион и кормление

Размороженные мыши или крысы. До 100 г: 10–15% массы каждые 5–7 дней; 100–300 г: 8–12% каждые 7–10 дней; более 300 г: 5–10% каждые 10–14 дней. Корм не шире 1–1,5 самой широкой части тела. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при кормлении цельными позвоночными.

Вода

Свежая вода постоянно; менять ежедневно; плановое купание не требуется.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полную уборку выполнять каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Перед контактом мыть руки от запаха корма; не брать 48 часов после кормления и при защитной позе.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Обязательная зимовка не нужна; охлаждение допускается только для разведения под контролем специалиста.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; совместное содержание со змеями запрещено из-за риска каннибализма.

Безопасность и особые риски

Высокий риск побега и укуса при запахе корма; все манипуляции выполнять вне кормового контекста.

Тревожные признаки

Потеря массы, длительный отказ от корма, рвота, дыхательные шумы, выделения, клещи, ожог, травма рта или неполная линька.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Kingsnake Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Mede E., CVT, California Kingsnake Care, Chicago Exotics Animal Hospital - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. VCA Animal Hospitals, Snakes: Housing, актуальная редакция - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Wiseman K. D. et al., Feeding ecology of the California Kingsnake, 2019. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Калифорнийская королевская змея · версия 5