

Уход за ковровым питоном

Ковровый питон

Особенности вида

Сильный полудревесный питон; регулярно использует высокие присады.

Размер

При вылуплении 30–45 см; взрослые самцы 150–220 см, самки 180–300 см.

Продолжительность жизни

15–25 лет.

Активность и режим дня

Сумеречный и ночной; может греться днём.

Ареал обитания

Австралия, Новая Гвинея и соседние острова; леса, саванны и скальные местообитания от умеренного до тропического климата.

Террариум

Пластик, стекло или герметизированная древесная плита, горизонтально-вертикальный. Для взрослой змеи длиной до 2 м минимально допустимый размер – 120 × 60 × 90 см, комфортный – длина не меньше длины тела, ширина не меньше половины длины тела и высота от 90 см. Для змеи длиннее 2 м минимальные длина, ширина и высота составляют соответственно 2/3, 1/3 и 1/2 длины тела; комфортная длина позволяет полностью вытянуться, высота – не меньше 120 см. Двери закрываются двумя фиксаторами; щели недопустимы. Приток воздуха располагают внизу прохладной стороны, выход – вверху тёплой; лампы отделяют защитной сеткой.

Оборудование террариума

- Террариум рассчитанного по длине змеи размера с двумя фиксаторами дверей;
- Верхняя греющая лампа или лучистая панель, защитная сетка и совместимый термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два тесных укрытия на разных уровнях и влажная камера;
- Субстрат, тяжёлая поилка-купалка, прочные ветви и полки;
- Светильник видимого дневного света и таймер;
- Для молоди в небольшом контейнере – термоковрик размером 25–33% площади дна и отдельный термостат.

Субстрат

Постоянный слой 5–10 см из кокосовых чипсов, кипарисовой мульчи либо смеси органической почвы без удобрений и кокосового волокна. Нижнюю часть слоя поддерживают слегка влажной, поверхность оставляют почти сухой. Обеспыленное осиновое или тополево волокно допустимо только при влажности ближе к нижней границе и заменяется сразу после намокания. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик без петель допустимы на карантине и при лечении; коврик не заменяет отдельную ёмкость с рыхлым грунтом. Буковая щепка не используется из-за слабого удержания влаги и риска проглатывания. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и чистый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия на разных уровнях и влажная камера; закреплённые ветви и полки диаметром, выдерживающим массу змеи.

Активность и обогащение среды

Вертикальные маршруты, несколько высот прогрева, тоннели и сменяемые безопасные запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая устойчивая ёмкость; для молоди – с возможностью полного погружения, для взрослых – доступная купальная ёмкость при достаточной площади.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 31–33 °C, воздух в прохладной зоне 23–26 °C, ночью 21–24 °C. Верхний нагреватель устанавливают над прочной ветвью у одного края, закрывают сеткой и подключают к термостату. Датчик закрепляют на доступной змее высоте в зоне прогрева; температуру воздуха проверяют двумя цифровыми термометрами, поверхность ветви – инфракрасным. Для молоди термоковрик можно закрепить снаружи под четвертью или третью дна небольшого контейнера и подключить к отдельному термостату. Греющий камень запрещён.

Влажность

50–70%; измерять цифровыми гигрометрами в средней части и у прохладного укрытия. При показателе ниже 50% опрыскать чистой водой субстрат и листья в прохладной половине либо включить автоматическую дождевальную установку через гигростат до возвращения показателя в диапазон. Между увлажнениями поверхность должна подсыхать. Во время линьки увлажнить сфагnum во влажной камере и временно поддерживать 70–80%; постоянный конденсат недопустим. Резервуар и трубки автоматической системы мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Светильник видимого дневного света включать таймером на 12 часов; ночью обеспечивать 12 часов темноты.

Рацион и кормление

Размороженные грызуны и птица. До 500 г: 10–12% массы каждые 7–10 дней; 0,5–2 кг: 7–10% каждые 10–14 дней; более 2 кг: 5–7% каждые 14–21 день. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при использовании цельных кормовых объектов.

Вода

Свежая вода постоянно; менять ежедневно и после загрязнения; принудительное купание не требуется.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Поддерживать всё тело; при длине более 2 м работать вдвоём; не брать 48 часов после кормления.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Обязательный покой не нужен; сезонное охлаждение только в программе разведения.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно с паразитологическим обследованием; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Сильный кормовой бросок и хватательный хвост; лицо и шею держать вне досягаемости.

Тревожные признаки

Дыхание с открытым ртом, выделения, потеря массы, рвота, ожог, клещи, неполная линька, отёк рта или нарушение координации.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Carpet Python Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. SASH Vets, Python Care: Morelia Species, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. PIAA, Carpet Python Fact Sheet, 2020 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Ковровый питон · версия 5