

Уход за китайским триониксом

Китайский трионикс

Особенности вида

Имеет мягкий кожистый панцирь и длинную подвижную шею; почти полностью зарывается в песок.

Размер

При вылуплении 3-4 см; взрослые самцы 15-25 см, самки 25-40 см.

Продолжительность жизни

20-30 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный, водный.

Ареал обитания

Дальний Восток России, Китай, Корея, Япония и Вьетнам; тёплые реки, озёра и пруды с песчаным дном.

Террариум

Стекланный или пластиковый акватеррариум с сетчатой крышкой. Для взрослого самца минимум – 120 × 50 см по дну и 200 л фактического объёма воды, комфортно – от 150 × 60 см по дну и 300 л; для самки минимум – 150 × 60 см по дну и 300 л воды, комфортно – от 200 × 80 см по дну и 500 л. Глубина воды – не менее двух длин панциря, но животное должно легко достигать поверхности. Сухой остров имеет гладкий пологий вход; крышка и вводы исключают побег. Высоту корпуса подбирать отдельно под фактическую глубину воды, субстрат, полностью сухой остров и защиту от побега; приведённая площадь дна не означает, что корпус высотой 60 см подходит самой крупной взрослой особи.

Оборудование террариума

- Акватеррариум выбранного по полу размера с сетчатой крышкой;
- Внешний канистровый фильтр, рассчитанный минимум на тройной фактический объём воды;
- Аквариумный нагреватель с термостатом и защитным кожухом;
- Компрессор с распылителем;
- Гладкий сухой остров с пологим входом;
- Белая лампа прогрева с термостатом и защитной сеткой;
- Линейная UVB-лампа 5-7% с отражателем и таймером;
- Водный и воздушный цифровые термометры, инфракрасный термометр и измеритель UVI;
- Капельные тесты на аммиак, нитрит и pH, средство для подготовки воды;
- Мелкий окатанный песок, сифон, кормовые щипцы и полнорационные гранулы.

Субстрат

Промытый мелкий окатанный песок слоем 10-15 см, позволяющий полностью закопаться; поверхность очищают сифоном при каждой подмене. Пластиковый коврик, салфетки, кокосовые чипсы, волокна тополя и буковая щепка в воде не применяются. Гравий, острые камни, грубые пластиковые растения и абразивные трапы запрещены из-за травм мягкого панциря.

Укрытия и оформление

Песчаная зона для полного закапывания, подводное укрытие с двумя выходами и пологий остров.

Активность и обогащение среды

Свободное плавание, мягкое течение и поиск спрятанного корма.

Поилка

Не применяется; вода акватеррариума питьевая и купальная.

Температура и обогрев

Вода 25-28 °C, поверхность острова 30-32 °C. Нагреватель полностью погружают, закрывают кожухом и проверяют водным термометром. Белая лампа прогревает весь панцирь; датчик термостата закрепляют на высоте панциря.

Влажность

Отдельное повышение влажности не требуется; сетчатая крышка отводит влажный воздух, остров полностью высыхает между выходами черепахи.

Освещение и световой день

UVB включать на 12 часов. На острове поддерживать UVI 2,0-3,0, в тени – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Между лампой и панцирем не должно быть стекла или пластика.

Рацион и кормление

Полнорационные гранулы, дождевые черви, моллюски, ракообразные и цельная мелкая рыба; молодёжь ежедневно, взрослые через день, порция 2-3% массы.

Витамины и минеральные добавки

Сепия постоянно; специальные добавки не нужны при полноценном разнообразном рационе.

Вода

Аммиак и нитрит 0 мг/л, нитрат менее 40 мг/л, pH 6,5–7,5. Ежедневно подменять 25–33% на дехлорированную воду той же температуры; при обнаружении аммиака или нитрита менять 50% ежедневно до нулевых показаний. До заселения запустить биофильтр и подтвердить тестами устойчивую переработку отходов: аммиак и нитрит – 0 мг/л. После заселения регулярно контролировать качество воды. После подмены повторить тест; если загрязнение сохраняется, проверить работу биофильтра и подобрать дополнительные меры.

Уборка

Остатки корма ежедневно; фильтр обслуживать по потоку; песок очищать сифоном еженедельно.

Контакт и безопасность

Не брать без необходимости; при переносе использовать контейнер, а не удерживать руками.

Линька

Тонкая кожа периодически обновляется небольшими прозрачными участками; их не снимают руками. Обширное отслаивание, покраснение, язвы, налёт или неприятный запах не являются нормальной линькой и требуют проверки качества воды и осмотра ветеринарным врачом по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка в помещении не нужна.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одной.

Безопасность и особые риски

Глубокий болезненный укус, травма мягкого панциря и быстрое ухудшение при грязной воде.

Тревожные признаки

Белые или красные пятна панциря, язвы, крен, дыхание ртом, отёк глаз, отказ от корма или невозможность нырять.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Herpeton Academy, Chinese Softshell Turtle Care Sheet, ред. 2026 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Austin's Turtle Page, Chinese Softshell Care Sheet - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Wang et al., Aquaculture Research, 2025 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Liu et al., Gut microbiota of homologous Chinese soft-shell turtles in different habitats, 2021 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Divers S. J., Stahl S. J., eds., Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Girling S. J., Raiti P., eds., BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Carpenter J. W., Exotic Animal Formulary, 6th ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Royal Veterinary College, Aquarium health and nitrogen cycle (2024) - Establishing an aquarium; Testing for toxins

Китайский трионикс · версия 4