

# Уход за реснитчатым гекконом

## Реснитчатый геккон

### Особенности вида

Лазает по гладким поверхностям; отброшенный хвост не отрастает.

### Размер

При вылуплении 7–10 см; взрослые самцы и самки 20–25 см.

### Продолжительность жизни

15–20 лет.

### Активность и режим дня

Сумеречный и ночной, древесный.

### Ареал обитания

Юг Новой Каледонии; влажные тропические леса с прохладными ночами.

### Террариум

Стекланный или пластиковый, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 45 × 45 × 60 см, комфортный – от 60 × 45 × 90 см. Дверца закрывается на фиксатор, щели недопустимы. Сетчатая крыша и отверстия в нижней части передней стенки создают движение воздуха снизу вверх. Лампы располагают снаружи над сеткой.

### Оборудование террариума

- Вертикальный террариум выбранного размера с фиксатором;
- Белая дневная греющая лампа 25–40 Вт с диммирующим термостатом;
- Линейная T5 UVB-лампа 5–7% с отражателем и таймером;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Ручной помповый опрыскиватель;
- Ветви, пробковые трубки и густая безопасная листва;
- Две кормовые чашки на высоте и устойчивая поилка;
- Субстрат, кальций и мультивитамин для рептилий.

### Субстрат

Для постоянного содержания – 5–8 см смеси грунта без удобрений, кокосового волокна и мелкой безопасной коры над дренажным слоем, сверху лиственной опад. Кокосовые чипсы используют только как часть смеси, а не крупным самостоятельным слоем. Цельный непористый пластиковый коврик допустим вместе с отдельной влажной камерой, если его ежедневно осматривают, моют после загрязнения и держат второй комплект на замену. Бумажные салфетки используют в карантине и у малышей до 12–15 г. Волокна осины или тополя и буковая щепа плохо удерживают нужную влажность и не подходят как основной субстрат. Сосновая и кедровая стружка запрещены из-за раздражающих летучих веществ.

### Укрытия и оформление

Густая листва, минимум два закрытых участка кроны, пробковые трубки и ветви разного диаметра.

### Активность и обогащение среды

Непрерывные вертикальные маршруты, гибкие ветви, кормовые площадки на разных уровнях.

### Поилка

Неглубокая ёмкость на высоте и ежедневные капли воды на листьях.

### Температура и обогрев

Поверхность верхней ветви 26–28 °C, воздух в верхней части 24–26 °C, внизу 21–24 °C, ночью 18–22 °C. Белую лампу ставят над одной стороной крыши и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на верхней ветви на высоте спины. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

### Влажность

Днём дать влажности снизиться до 40–50%, вечером поднять до 70–80%. Вечером опрыскать листья, стенки и прохладную часть грунта чистой водой из помпового пульверизатора до появления капель; утром повторить только при показании ниже 40%. Опрыскивание прекратить, когда гигрометр показывает 70–80%; к середине дня листья и верхний слой грунта должны высохнуть. Постоянный конденсат, мокрый грунт и затхлый запах означают избыток влаги. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

### Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу включать на 12 часов; на верхней ветви поддерживать UVI 0,7-1,0, в густой листве – 0. Расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать темноту.

### Рацион и кормление

Полнорационная смесь для реснитчатых гекконов и выращенные кормовые насекомые. До 12 месяцев смесь предлагать ежедневно, насекомых – дважды в неделю; взрослым смесь давать 3 раза, насекомых – 1 раз в неделю. Смесь разводить водой по инструкции производителя и удалять через 24 часа; насекомое должно быть не шире головы геккона. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

### Витамины и минеральные добавки

В полнорационную смесь ничего не добавлять. Насекомых при каждом кормлении помещать в закрывающуюся ёмкость с щепоткой кальция без D3, встряхивать до тонкого покрытия и сразу скармливать; мультивитамин использовать вместо кальция 1–2 раза в месяц.

### Вода

Воду менять ежедневно, вечером опрыскивать; купание не требуется.

### Уборка

Несъеденную смесь удалять через 24 часа; загрязнения ежедневно; полная уборка раз в 4 недели.

### Контакт и безопасность

Давать переходить с ладони на ладонь; не хватать за хвост и не допускать прыжка с высоты.

### Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

### Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна.

### Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; постоянно содержать по одному.

### Безопасность и особые риски

Перегрев выше 29 °C, падения и автотомия хвоста.

### Тревожные признаки

Потеря массы, мягкая челюсть, волнистый хвост, задержка линьки, диарея, вялость или отказ удерживаться на стекле.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. RSPCA, Crested Gecko Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. ReptiFiles, Crested Gecko Care Manual, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Divers S. J., Stahl S. J., eds., Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Girling S. J., Raiti P., eds., BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Warwick C. et al., eds., Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Baines F. M. et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Реснитчатый геккон · версия 4