

Уход за аргентинским тараканом

Аргентинский таракан

Особенности вида

Не летает при обычном содержании и не поднимается по чистому гладкому пластику; самка рождает живых нимф.

Размер

Новорождённые 4-5 мм; взрослые самцы 4-5 см, самки 4-4,5 см.

Продолжительность жизни

1,5-2 года.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Южная Америка; тёплый лесной опад и полости древесины.

Террариум

Допустим гладкий пищевой пластиковый контейнер. Для колонии до 500 взрослых минимально допустимый размер – 60 × 40 × 40 см; комфортный – 80 × 50 × 50 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляционные окна из мелкоячеистой металлической сетки, не пропускающей самых маленьких нимф на крышке и верхних боковых стенках.

Оборудование террариума

- Гладкий контейнер выбранного размера с металлической сетчатой вентиляцией и фиксаторами;
- Наружный боковой термоковрик, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Яичные лотки или сетки, кормовые площадки и отдельная ёмкость для сортировки;
- Водный гель или фитильная поилка и мелкая кормовая площадка для свежих овощей;
- Второй пустой контейнер для уборки и предотвращения побега.

Субстрат

Голое дно; субстрат не нужен.

Укрытия и оформление

Вертикальные яичные лотки с проходами.

Активность и обогащение среды

Большая поверхность и отдельные сухие и влажные кормовые точки.

Поилка

Водный гель или овощи; открытая вода запрещена.

Температура и обогрев

Для размножения 28-32 °С, для хранения 22-26 °С; боковой обогрев под термостатом.

Влажность

40-60%. Влагу дают водным гелем и свежими овощами; при показании ниже 40% увеличить их небольшую порцию и прекратить на 50-55%. Конденсат, мокрый картон и плесень означают избыток влаги.

Освещение и световой день

10-12 часов слабого света; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Полнорационный сухой корм постоянно, овощи и зелень 3-5 раз в неделю; gut-loading 24-72 часа рационом с 8-10% кальция.

Витамины и минеральные добавки

Отдельная присыпка колонии не нужна; перед скармливанием – минеральный gut-loading.

Вода

Гель или свежий влажный корм менять ежедневно; не опрыскивать.

Уборка

Влажный корм через 24 часа, погибших сразу, фрасс каждые 2-4 недели.

Контакт и безопасность

Работать над вторым контейнером; мыть руки, при пыли использовать маску.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

Новая партия 30 дней отдельно; после осмотра на клещей.

Тревожные признаки

Массовая гибель, плесень, клещи, запах, деформация или остановка размножения.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Побег нимф, плесень, клещи и аллергены фасса.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. EAZA Live Food Species Manual - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Reptiles, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Finke, feeder insect nutrition - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Smithsonian National Zoo, Body by Bugs, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Blattodea Species File, Blaptica dubia - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Аргентинский таракан · версия 4