

Уход за священным древолазом

Священный древолаз

Особенности вида

Дневная территориальная лягушка; разведённые в неволе особи не накапливают природные кожные токсины без соответствующего рациона.

Размер

После метаморфоза 1–1,5 см; взрослые самцы 3,5–4,5 см, самки 4–5,5 см.

Продолжительность жизни

10–15 лет.

Активность и режим дня

Дневной, наземно-древесный.

Ареал обитания

Гвиана, Суринам, Французская Гвиана и север Бразилии; влажные тропические леса.

Террариум

Стеклянный, горизонтальный или кубический. Для одной взрослой особи минимум – 30 × 30 × 30 см, комфортно – от 45 × 45 × 45 см; для пары минимум – 45 × 45 × 45 см, комфортно – от 60 × 45 × 45 см. Дверцы закрываются без щелей. Нижняя приточная полоса и узкая верхняя сетчатая полоса обеспечивают обмен воздуха, а остальная крыша удерживает влагу. Дно имеет герметичный дренажный слой.

Оборудование террариума

- Стеклянный террариум выбранного размера с герметичным дренажем;
- Линейная UVB-лампа низкой мощности и яркий светильник для растений с таймером;
- Цифровой термометр, цифровой гигрометр и измеритель UVI;
- Автоматическая дождевальная установка или помповый пульверизатор;
- Кондиционер от хлора и хлорамина;
- Дренаж, разделительная сетка, грунт, толстый лиственный опад, пробка и живые растения;
- Мелкая поилка, культуры дрозофил и коллембол, кальций и мультивитамин.

Субстрат

Дренажный слой отделяют сеткой; сверху размещают 8–12 см смеси грунта без удобрений, кокосового волокна и листового перегноя, затем 3–5 см суховатого листового опада. Кокосовые чипсы допустимы только в нижней смеси. Бумажные салфетки используют в карантине и меняют ежедневно. Пластиковый коврик, волокна осины или тополя и буковая щепа не обеспечивают устойчивый влажный микроклимат и не подходят постоянно. Гравий, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Кокосовые домики, листья, коряги, бромелии и минимум два укрытия на животное.

Активность и обогащение среды

Живые растения, микрофауна, перепады высоты и рассредоточенная подача корма.

Поилка

Мелкая ёмкость глубиной до 1–2 см с пологим выходом.

Температура и обогрев

Днём 22–26 °C, ночью 20–22 °C. Температуру поддерживают обогревом помещения; при локальном нагреве используют только защищённый верхний источник с термостатом и датчиком у грунта. Температура 28 °C и выше опасна.

Влажность

80–95%, измерять у грунта. Утром и вечером дождевальная система или пульверизатор смачивает листья и стенки дехлорированной водой до 90–95%; между циклами верх листового опада должен частично подсохнуть. Дренажную воду удаляют до контакта с грунтом. Постоянный конденсат, кислый запах и разложившийся в кашу опад означают переувлажнение и недостаточный воздухообмен. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов; UVB с UVI 0,5–1,0.

Рацион и кормление

Бескрылые дрозиды, коллемболы и мелкая мокрица; молодь ежедневно, взрослые 5–6 раз в неделю небольшими порциями. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

При каждом кормлении дрозидов помещать в высокий стакан с щепоткой порошка, осторожно вращать до тонкого покрытия и сразу выпускать в террариум. Кальций без D3 использовать при четырёх кормлениях подряд, затем один раз мультивитамин; кальций с D3 использовать дважды в месяц вместо обычного кальция. Выбирать мультивитамин для амфибий с готовой формой витамина А (ретинола ацетат или пальмитат). Дозировку и частоту определять по составу и инструкции; отдельный витамин А без назначения ветеринара не давать.

Вода

Только дехлорированная или обратноосмотическая реминерализованная вода; опрыскивать ежедневно.

Уборка

Погибший корм и видимые загрязнения ежедневно; стекло еженедельно; субстрат менять участками.

Контакт и безопасность

Не брать руками; перемещать во влажном контейнере.

Линька

Лягушка регулярно сбрасывает очень тонкий наружный слой кожи и обычно сразу съедает его, поэтому процесс часто остаётся незаметным; это нормально. Иногда животное выгибается и проводит лапами по телу, помогая коже сойти. Кожу не снимают руками. Длительное отслаивание, покраснение, язвы или вялость требуют проверки условий содержания и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен; размножение регулируют дождеванием.

Карантин и подселение

Минимум 60 дней отдельно с тестом на хитридиомикоз и ранами; группы только при достаточной площади и контроле агрессии.

Безопасность и особые риски

ПЕРЕГРЕВ выше 28 °C, пересыхание, утопление и химическое загрязнение.

Тревожные признаки

Истончение, судороги, покраснение кожи, слабость, отказ от корма, отёк или потеря координации.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Amphibian Medicine and Captive Husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. AZA Amphibian Husbandry Resource Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. AmphibiaWeb, *Dendrobates tinctorius* - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Carpenter's Exotic Animal Formulary, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. EAZA Amphibian TAG guidance. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Священный древолаз · версия 4