

Уход за императорским удавом

Императорский удав

Особенности вида

Сильный древесно-наземный удав; молодые особи лазают чаще взрослых.

Размер

При рождении 35–55 см; взрослые самцы 150–210 см, самки 180–270 см.

Продолжительность жизни

20–30 лет.

Активность и режим дня

Преимущественно сумеречный и ночной.

Ареал обитания

Мексика, Центральная Америка и северо-запад Южной Америки; леса, саванны и речные долины тропического и субтропического климата.

Террариум

Пластик, стекло или герметизированная древесная плита, горизонтальный. Для взрослой змеи длиной до 2 м минимально допустимый размер – 120 × 60 × 60 см, комфортный – от 180 × 90 × 90 см. Для змеи длиннее 2 м минимальные длина, ширина и высота террариума составляют соответственно 2/3, 1/3 и 1/2 длины тела; комфортный размер позволяет змее полностью вытянуться, а ширина и высота составляют не меньше половины длины тела. Например, для самки длиной 240 см минимум – 160 × 80 × 120 см, комфортный размер – от 240 × 120 × 120 см. Двери закрываются двумя независимыми фиксаторами; щели недопустимы. Приточные отверстия располагают внизу прохладной стороны, вытяжные –верху тёплой; сетка и крепления должны выдерживать давление змеи.

Оборудование террариума

- Террариум рассчитанного по длине змеи размера с двумя фиксаторами дверей;
- Верхний лучистый обогреватель или керамический нагреватель без света, защитная решётка и совместимый термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два прочных тесных укрытия и влажная камера для молоди и периода линьки;
- Субстрат, тяжёлая поилка-купалка, толстые закреплённые ветви и полки;
- Таймер для дневного светового режима и ручной опрыскиватель.

Субстрат

Постоянный слой 8–12 см из кокосовых чипсов, кипарисовой мульчи либо смеси органической почвы без удобрений и кокосового волокна. Нижнюю часть слоя поддерживают слегка влажной, поверхность оставляют почти сухой; мокрые и заплесневевшие участки удаляют. Бумажные салфетки допустимы на карантине и при лечении; их меняют сразу после загрязнения. Цельный непористый пластиковый или резиновый коврик без петель допустим для карантина и в очень крупном помещении, если есть два сменных комплекта и отдельные ёмкости с рыхлым грунтом для рытья. Осиновое и тополевое волокно допустимо только при устойчивой влажности не ниже 60% и отсутствии пыли; при намокании его сразу заменяют. Буковая щепа не используется: она слабо удерживает влагу и может быть проглочена с кормом. Сосновая и кедровая стружка, чистый песок, кукурузный наполнитель и пыльные материалы запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два прочных тесных укрытия, влажная камера для молоди и линяющих животных, толстые закреплённые ветви и полки.

Активность и обогащение среды

Лазательные опоры, разные уровни, укрытые маршруты и безопасные запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая ёмкость, которую змея не перевернёт; молодь может поместиться целиком, взрослой особи обеспечивают доступную купальную ёмкость при достаточной площади.

Температура и обогрев

Поверхность в зоне прогрева 30–32 °С, воздух в прохладной зоне 24–27 °С, ночью 22–25 °С. Верхний нагреватель размещают над одним краем террариума и полностью закрывают прочной решёткой. Нагреватель подключают к термостату, датчик которого закрепляют на высоте тела змеи в зоне прогрева; температуру воздуха проверяют двумя цифровыми термометрами, поверхность – инфракрасным. Для молоди в небольшом стеклянном или пластиковом контейнере термоковрик можно закрепить снаружи под четвертью или третью дна и подключить к отдельному термостату. Для взрослой змеи коврик не обеспечивает обогрев всего объёма. Греющий камень запрещён.

Влажность

60–75%; измерять цифровым гигрометром в средней части и в прохладном укрытии. Если показатель опустился ниже 60%, опрыскать прохладную половину чистой водой и небольшими порциями увлажнить нижний слой кокосового или почвенно-кокосового субстрата. Поверхность должна оставаться рыхлой, без луж; конденсат на всех стенках и затхлый запах означают переувлажнение. Во время линьки увлажнить наполнитель влажной камеры и временно поддерживать 75–85%. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Дневной светильник или рассеянный свет помещения включать на 12 часов; ночью обеспечивать 12 часов темноты.

Рацион и кормление

Размороженные грызуны и птица. До 500 г: 10–12% массы каждые 7–10 дней; 0,5–2 кг: 7–10% каждые 10–14 дней; более 2 кг: 5–7% каждые 14–28 дней. Не давать корм шире тела и не допускать ожирения. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при разнообразных цельных кормовых объектах.

Вода

Свежая вода постоянно; менять ежедневно и сразу после загрязнения; купание только добровольное.

Уборка

Точечная ежедневно; поилка ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Змею длиной до 2 м может удерживать один подготовленный взрослый, поддерживая тело в нескольких точках; при длине более 2 м необходим второй подготовленный взрослый. Не подносить змею к лицу и шее и не допускать свободного обвития туловища человека.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Обязательный покой не нужен; размножение и сезонное снижение температур проводят только по утверждённой программе.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно, обследование на клещей, кишечных паразитов и респираторные инфекции; постоянное совместное содержание не допускается.

Безопасность и особые риски

Крупная особь опасна укусом и сдавливанием; кормить щипцами, не допускать обвития шеи и обслуживать особь выше 2 м вдвоём.

Тревожные признаки

Дыхание с открытым ртом, выделения, рвота, потеря массы, отёк рта, ожог, клещи, неполная линька или слабость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Boa Constrictor Care Guide, ред. 16.11.2023 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Magnuson M., DVM, Large Snake Care Sheet, 2022 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. VCA Animal Hospitals, Snakes: Housing, актуальная редакция - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Императорский удав · версия 6