

Уход за императорским скорпионом

Императорский скорпион

Особенности вида

Крупный роющий скорпион с мощными клешнями; флуоресцирует в ультрафиолете.

Размер

Новорождённые 1-2 см; взрослые самцы и самки 15-20 см.

Продолжительность жизни

6-10 лет.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Западная Африка; влажные тропические леса и саванны.

Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Минимально допустимый размер – 45 × 30 × 30 см; комфортный – 60 × 45 × 30 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция перекрёстная, отверстия меньше тела.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с замком и закрытыми кабельными вводами;
- Термоковрик для наружной боковой установки, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Подготовленный грунт указанной глубины и тесное укрытие;
- Устойчивая мелкая поилка;
- Длинный пинцет, прозрачный ловчий контейнер и плотно закрывающаяся переносная ёмкость.

Субстрат

15-20 см уплотнённой влажной почвенно-кокосовой смеси.

Укрытия и оформление

Тесное укрытие и устойчивая нора; тяжёлые предметы на дне.

Активность и обогащение среды

Глубокий грунт, лиственный опад и кора.

Поилка

Мелкая тяжёлая ёмкость постоянно.

Температура и обогрев

24-28 °C, ночью 22-24 °C; обогрев сбоку или помещения, не снизу; термостат обязателен.

Влажность

70-85%. Гигрометр размещают у грунта. Ниже 70% налить воду вдоль одной стенки, увлажнив нижние две трети слоя, и прекратить на 80%. Верх частично просыхает; лужи, конденсат и болотный запах означают переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Слабый свет 10-12 часов; UVB не нужен, UV-фонарь только кратко для осмотра.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы и саранча; молодь 2-3 раза, взрослые 1-2 раза в неделю по 1-3 объекта.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Воду менять 2-3 раза в неделю; не купать.

Уборка

Остатки через 24 часа, помёт и плесень сразу; полная замена грунта только при загрязнении.

Контакт и безопасность

Руками не брать; перемещать контейнером и длинным мягким инструментом.

Линька

Перед линькой скорпион обычно отказывается от корма, меньше двигается, прячется, а покров тускнеет. После выхода из старого экзоскелета тело остаётся мягким и светлым, затем темнеет и твердеет; это нормально. Живой корм удаляют, скорпиона не тревожат и не берут в руки до полного затвердевания покрова. Застревание в старом экзоскелете требует помощи ветеринарного врача по экзотическим животным.

Карантин и подселение

60 дней отдельно; содержать по одному.

Тревожные признаки

Вялые поджатые конечности, сморщивание, травма с гемолимфой, плесень или незавершённая линька.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Укус клешнями, ужаление и аллергическая реакция.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Cincinnati Zoo, Pandinus imperator Husbandry SOP, 2023 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. EAZA Cyrtopholis BPG, 2021 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Amateur Entomologists' Society, Scorpion Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. The Scorpion Files, Pandinus imperator - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Herpeton Academy, Emperor Scorpion, 2026. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Императорский скорпион · версия 4