

Уход за южным толстохвостым скорпионом

Южный толстохвостый скорпион

Особенности вида

Пустынный скорпион с очень токсичным ядом и мощными хвостовыми сегментами.

Размер

Новорождённые 0,8–1,2 см; взрослые самцы и самки 8–10 см.

Продолжительность жизни

5–8 лет.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Северная Африка; каменистые пустыни и полупустыни.

Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Минимально допустимый размер – 30 × 30 × 30 см; комфортный – 45 × 30 × 30 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция широкая перекрёстная.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с замком и закрытыми кабельными вводами;
- Термоковрик для наружной боковой установки, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Подготовленный грунт указанной глубины и тесное укрытие;
- Устойчивая мелкая поилка;
- Длинный пинцет, прозрачный ловчий контейнер и плотно закрывающаяся переносная ёмкость.

Субстрат

8–12 см уплотнённой песчано-глинистой смеси.

Укрытия и оформление

Одно тесное укрытие; камни ставить на дно.

Активность и обогащение среды

Грунт для рытья и устойчивые плоские камни.

Поилка

Маленькая мелкая ёмкость постоянно.

Температура и обогрев

Днём 28–32 °C, ночью 20–24 °C; обогрев сбоку под термостатом, не снизу.

Влажность

30–40%. Поилка постоянно наполнена. Ниже 30% шприцем без иглы увлажнить только один небольшой угол и прекратить на 35–40%. Остальной грунт остаётся сухим; конденсат недопустим. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Слабый свет 10–12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Тараканы, сверчки и саранча; молодь 2 раза, взрослые раз в неделю.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Воду менять 2–3 раза в неделю; не опрыскивать и не купать.

Уборка

Только длинным инструментом; остатки через 24 часа.

Контакт и безопасность

Любой контакт руками запрещён; пересадка двумя закрывающимися контейнерами.

Линька

Перед линькой скорпион обычно отказывается от корма, меньше двигается, прячется, а покров тускнеет. После выхода из старого экзоскелета тело остаётся мягким и светлым, затем темнеет и твердеет; это нормально. Живой корм удаляют, скорпиона не тревожат и не берут в руки до полного затвердевания покрова. Застревание в старом экзоскелете требует помощи ветеринарного врача по экзотическим животным.

Карантин и подселение

60 дней отдельно; содержать по одному.

Тревожные признаки

Поджатые конечности, обезвоживание, гемолимфа, плесень или незавершённая линька.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Ужаление является неотложным состоянием; заранее иметь план вызова скорой помощи.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Amateur Entomologists' Society, Scorpion Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. The Scorpion Files, Androctonus australis - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Carpenter's Exotic Animal Formulary, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Cincinnati Zoo invertebrate husbandry SOP - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. WHO guidance on scorpion envenoming. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Южный толстохвостый скорпион · версия 4