

Уход за гигантским азиатским богомол

Гигантский азиатский богомол

Особенности вида

Засадный хищник с подвижной головой; самка может съесть самца.

Размер

Нимфа 0,7–1 см; взрослые самцы 7–9 см, самки 8–10 см.

Продолжительность жизни

Самцы 6–9 месяцев, самки 10–14 месяцев.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный.

Ареал обитания

Южная и Юго-Восточная Азия; тёплые влажные леса и кустарники.

Террариум

Допустим сетчатый либо стеклянный или пищевой пластиковый террариум с крупными сетчатыми вентиляционными панелями. Для одной взрослой особи минимально допустимый размер – 30 × 30 × 45 см; комфортный – 45 × 45 × 60 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция широкая перекрёстная и сетчатая крыша.

Оборудование террариума

- Высокий террариум выбранного размера с мелкой сетчатой вентиляцией;
- Цифровой термометр и гигрометр, таймер освещения;
- Помповый пульверизатор с подготовленной водой;
- Надёжно закреплённые ветви и сетка для линьки;
- Длинный кормовой пинцет и прозрачный ловчий контейнер.

Субстрат

Бумага либо 3–5 см почвенной смеси без удобрений.

Укрытия и оформление

Ветви и сетка для подвешивания; под местом линьки свободно две длины тела.

Активность и обогащение среды

Живые ветви и кормовые насекомые разных безопасных видов.

Поилка

Не ставится; воду даёт мелкое опрыскивание стенок.

Температура и обогрев

24–30 °C, ночью 20–24 °C; обогрев сбоку под термостатом, не снизу.

Влажность

50–70%. Ниже 50% слегка опрыскать одну стенку и листья, не направляя воду на богомола, и прекратить на 65%. Капли высыхают за сутки; постоянный конденсат означает переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов рассеянного света; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Мухи, тараканы, сверчки и саранча; нимфы ежедневно, взрослые 2–3 раза в неделю по 1–3 объекта не крупнее брюшка.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Стенки слегка опрыскивать 3–5 раз в неделю; не купать.

Уборка

Погибший корм и помёт ежедневно; полная уборка раз в 4 недели.

Контакт и безопасность

Дать самостоятельно перейти на руку; не хватать за конечности и брюшко.

Линька

Перед линькой насекомое перестаёт есть и неподвижно повисает вниз головой, затем выходит из старого экзоскелета; это нормально. Нужны свободное вертикальное пространство и надёжная поверхность для зацепа. Насекомое не трогают и не опрыскивают напрямую во время линьки и минимум 24–48 часов после неё. Живой корм удаляют; падение или застревание в старом покрове часто приводит к необратимой деформации.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Карантин и подселение

30 дней отдельно; содержать строго по одному.

Безопасность и особые риски

Падение во время линьки, каннибализм и укусы кормовых сверчков.

Тревожные признаки

Падения, деформация конечностей, чёрные пятна, сморщенное брюшко или незавершённая линька.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. EAZA Eumegalon blanchardi BPG, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Amateur Entomologists' Society, Mantis Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Mantodea Species File, Hierodula membranacea - актуальная видовая и таксономическая запись
5. InvertKeeping, Mantis Husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Chapman, The Insects. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Гигантский азиатский богомол · версия 4