

Уход за австралийским палочником

Австралийский палочник

Особенности вида

Самки способны к партеногенезу; при защите изгибают брюшко как скорпион.

Размер

Нимфа 1,5–2 см; взрослые самцы 10–12 см, самки 12–15 см.

Продолжительность жизни

Самцы 8–12 месяцев, самки 12–18 месяцев.

Активность и режим дня

Ночной, древесный.

Ареал обитания

Восток Австралии и Новая Гвинея; эвкалиптовые леса.

Террариум

Допустим сетчатый либо стеклянный или пищевой пластиковый террариум с крупными сетчатыми вентиляционными панелями. Для группы до трёх взрослых минимально допустимый размер – 45 × 45 × 90 см; комфортный – 60 × 60 × 120 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция широкая перекрёстная и сетчатая крыша.

Оборудование террариума

- Высокий террариум выбранного размера с мелкой сетчатой вентиляцией;
- Цифровой термометр и гигрометр, таймер освещения;
- Помповый пульверизатор с подготовленной водой;
- Надёжно закреплённые ветви и сетка для линьки;
- Сосуды с кормовыми ветвями, горловины которых полностью закрыты сеткой.

Субстрат

Бумага либо 3–5 см почвенной смеси без удобрений.

Укрытия и оформление

Кормовые ветви и сетка; под местом линьки свободно три длины тела.

Активность и обогащение среды

Свежие ветви кормовых растений разной толщины.

Поилка

Открытая вода запрещена; сосуд с ветвями плотно закрыт вокруг стеблей.

Температура и обогрев

20–26 °C, ночью 18–22 °C; обогрев сбоку под термостатом только ниже диапазона.

Влажность

60–80%. Ниже 60% опрыскать кормовые листья и одну стенку и прекратить на 75%. Листья высыхают за сутки; конденсат, плесень и мокрый помёт означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов рассеянного света; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Постоянно свежие листья эвкалипта, ежевики, малины, розы или дуба без пестицидов; новый корм вводить вместе с привычным.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Листья слегка опрыскивать ежедневно; не купать.

Уборка

Засохшие листья и помёт еженедельно; яйца собирать отдельно.

Контакт и безопасность

Дать перейти на руку; не тянуть за ноги и не брать во время линьки.

Линька

Перед линькой насекомое перестаёт есть и неподвижно повисает вниз головой, затем выходит из старого экзоскелета; это нормально. Нужны свободное вертикальное пространство и надёжная поверхность для зацепа. Насекомое не трогают и не опрыскивают напрямую во время линьки и минимум 24–48 часов после неё. Живой корм удаляют; падение или застревание в старом покрове часто приводит к необратимой деформации.

Карантин и подселение

30 дней отдельно; держать только с особями того же вида сходного размера.

Тревожные признаки

Повторные падения, деформация ног, невозможность линять, чёрные участки или отказ держаться на ветви.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Падение, утопление в сосуде для ветвей и пестициды.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. EAZA terrestrial invertebrate guidance - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Amateur Entomologists' Society, Stick Insect Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Phasmida Species File, Extatosoma tiaratum - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Australian Museum species account - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Chapman, The Insects. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Австралийский палочник · версия 4