

Уход за гигантским шиповатым палочником

Гигантский шиповатый палочник

Особенности вида

Тяжёлый наземно-древесный палочник; самцы защищаются крупными шипами задних ног.

Размер

Нимфа 1,5–2 см; взрослые самцы 10–12 см, самки 12–15 см.

Продолжительность жизни

Самцы 12–18 месяцев, самки 18–24 месяца.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Новая Гвинея; влажные тропические леса.

Террариум

Допустим сетчатый либо стеклянный или пищевой пластиковый террариум с крупными сетчатыми вентиляционными панелями. Для группы до трёх взрослых минимально допустимый размер – 60 × 45 × 60 см; комфортный – 90 × 45 × 90 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Перекрёстная и верхняя.

Оборудование террариума

- Высокий террариум выбранного размера с мелкой сетчатой вентиляцией;
- Цифровой термометр и гигрометр, таймер освещения;
- Помповый пульверизатор с подготовленной водой;
- Надёжно закреплённые ветви и сетка для линьки;
- Сосуды с кормовыми ветвями, горловины которых полностью закрыты сеткой.

Субстрат

8–12 см влажной почвенной смеси без удобрений и лиственной опад.

Укрытия и оформление

Пробковая кора, толстые ветви и тёмные наземные укрытия.

Активность и обогащение среды

Кормовые ветви, глубокий грунт для яиц и разные укрытия.

Поилка

Открытая вода запрещена; сосуд с ветвями закрыт вокруг стеблей.

Температура и обогрев

22–26 °C, ночью 20–22 °C; обогрев сбоку при необходимости.

Влажность

70–85%. Ниже 70% опрыскать кормовые листья и одну стенку и прекратить на 80%. Листья частично высыхают между циклами; постоянный конденсат, плесень и мокрый помёт означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов рассеянного света; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Постоянно листья ежевики, малины, розы, дуба или бука без пестицидов.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Листья опрыскивать ежедневно; не купать.

Уборка

Засохшие листья и помёт еженедельно; яйца собирать из грунта.

Контакт и безопасность

Не брать самца за тело и ноги; перемещать на ветви или контейнере.

Линька

Перед линькой насекомое перестаёт есть и неподвижно повисает вниз головой, затем выходит из старого экзоскелета; это нормально. Нужны свободное вертикальное пространство и надёжная поверхность для зацепа. Насекомое не трогают и не опрыскивают напрямую во время линьки и минимум 24–48 часов после неё. Живой корм удаляют; падение или застревание в старом покрове часто приводит к необратимой деформации.

Карантин и подселение

30 дней отдельно; взрослых самцов не скучивать.

Тревожные признаки

Падения, деформация ног, незавершённая линька, чёрные участки или слабый хват.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Шипы самца прокалывают кожу; опасны пестициды и открытая вода.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. EAZA terrestrial invertebrate guidance - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Amateur Entomologists' Society, Stick Insect Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Phasmida Species File, Eurycantha calcarata - актуальная видовая и таксономическая запись
5. museum species accounts - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Chapman, The Insects. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Гигантский шиповатый палочник · версия 4