

Уход за западным свиноносым ужом

Западный свиноносый уж

Особенности вида

Роющая заднебороздчатая змея; при защите раздувает шею, шипит и может притворяться мёртвой.

Размер

При вылуплении 15–20 см; взрослые самцы 35–55 см, самки 60–90 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный; значительную часть времени проводит в грунте.

Ареал обитания

Центральная часть Северной Америки; прерии, песчаные равнины и полупустыни умеренного сухого климата.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтальный, с высоким бортиком для глубокого грунта. Для взрослого самца минимально допустимый размер – 60 × 30 × 30 см, комфортный – от 75 × 40 × 40 см; для взрослой самки минимум – 60 × 45 × 40 см, комфортный размер – от 90 × 45 × 45 см. Дверцы или крышка закрываются на замок; щели и вентиляционные отверстия должны быть уже головы змеи. Приток воздуха располагают внизу прохладной стороны, выход – вверх тёплой. Молодь можно содержать в меньшем контейнере с заменой по мере роста либо в указанном объёме с глубоким грунтом и множеством укрытий.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного по полу и размеру змеи объёма с замком;
- Верхняя галогенная лампа мощностью от 50 Вт, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Линейная UVB-лампа 5–7% с отражателем, целевым UVI 2,0–3,0 и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два тесных укрытия и влажная камера;
- Рыхлый субстрат, неглубокая тяжёлая поилка, кора и тоннели.

Субстрат

Постоянный рыхлый слой 8–12 см из смеси 70% органической почвы без удобрений и 30% промытого песка либо из обеспыленной мелкой осиновой или тополевой стружки/волокна, включая лигноцел. Грунт должен держать тоннели и не быть мокрым. Бумажные салфетки допустимы только на карантине, при лечении и для краткого наблюдения за молодью; цельный непористый пластиковый коврик – только на тот же период, поскольку на нём нельзя рыть. Кокосовое волокно и чипсы не включаются в основной слой: современные видовые руководства расходятся в их допустимости, а рыхлый кокос хуже удерживает тоннели. Буковая щепа не подходит из-за крупной твёрдой фракции. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель, чистый и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия, влажная камера на период линьки, кора и тоннели под грунтом.

Активность и обогащение среды

Глубокий субстрат для рытья, разные фактуры и безопасные запаховые объекты.

Поилка

Неглубокая устойчивая ёмкость, которую змея не перевернёт; постоянное замачивание грунта не допускается.

Температура и обогрев

Поверхность обогрева 32–35 °С, воздух в средней части 24–29 °С, в прохладной зоне 21–24 °С; ночью допустимо снижение до 18–22 °С. Галогенную лампу устанавливают над одним краем террариума, закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату. Датчик закрепляют на поверхности обогрева; температуру воздуха проверяют двумя цифровыми термометрами, поверхность – инфракрасным. Термоковрик не используют как основной обогрев: роющая змея должна иметь возможность уходить в более прохладный грунт. Если ночью в помещении ниже 18 °С, над тёплым краем устанавливают керамический нагреватель без света с отдельным термостатом. Греющий камень запрещён.

Влажность

30–50%; измерять цифровым гигрометром в средней части террариума. Если показатель опустился ниже 30%, слегка увлажнить чистой водой только почву в прохладном углу; осиновую или тополевою стружку не опрыскивать. Во влажную камеру положить влажный сфагнум или сложенную бумажную салфетку и поддерживать внутри 65–75% во время линьки. Тёплая половина и большая часть поверхности должны оставаться сухими; конденсат недопустим. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов света и 12 часов полной темноты. Линейную UVB-лампу длиной от половины до двух третей террариума размещают над зоной прогрева; на высоте спины змеи максимальный UVI должен составлять 2,0–3,0, а в укрытиях – 0. Расстояние до лампы выбирают по таблице производителя и проверяют измерителем UVI. Ночная подсветка запрещена.

Рацион и кормление

Размороженные мыши. До 60 г: 10–15% массы каждые 5–7 дней; 60–200 г: 8–12% каждые 7–10 дней; более 200 г: 5–10% каждые 10–14 дней. Корм не шире самой широкой части тела. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при кормлении цельными позвоночными.

Вода

Свежая вода постоянно; менять ежедневно; плановое купание не требуется.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Брать сбоку, поддерживая тело; не подносить к лицу и не давать обвивать пальцы; не брать 48 часов после кормления.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Обязательная зимовка не нужна; охлаждение только для разведения по программе специалиста.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Укус может вызвать боль, отёк и аллергическую реакцию; при укусе не отрывать змею силой, промыть место и обратиться за медицинской помощью при нарастании симптомов.

Тревожные признаки

Потеря массы, стойкий отказ от корма, отёк головы или рта, дыхательные шумы, выделения, рвота, клещи, ожог или неполная линька.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, North American Hognose Snake Care Guide, ред. 31.07.2026 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Magnuson M., DVM, Western Hognose Care Sheet, 2022 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Chicago Exotics Animal Hospital, Western Hognose Care, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Surrey Reptile Centre, Western Hognose Care Sheet, 2022 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Nagabaskaran G. et al., Western Hognose Snakes Prefer Environmental Enrichment, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025. - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Западный свиноносы ужал · версия 6