

Уход за балканской черепахой

Балканская черепаха

Особенности вида

Кончик хвоста оканчивается роговым шипом; самцы имеют более длинный хвост.

Размер

При вылуплении 3-4 см; взрослые самцы 13-20 см, самки 16-28 см.

Продолжительность жизни

50-80 лет.

Активность и режим дня

Дневной.

Ареал обитания

Южная Европа и Балканы; сухие редколесья, луга и кустарники средиземноморского климата.

Террариум

Непрозрачный открытый стол или напольный загон. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 200 × 100 × 50 см, комфортный – от 300 × 150 × 60 см. Верх открыт, но защищён от сквозняка. Стенки гладкие, без щелей и достаточно высокие для предотвращения перелезания; при уличном содержании бортик заглубляют и закрывают вольер прочной сеткой сверху. Лампы крепят вне досягаемости.

Оборудование террариума

- Открытый непрозрачный загон выбранного размера;
- Две белые галогенные лампы прогрева с термостатом и защитными сетками;
- Линейная T5 UVB-лампа 10-12% с отражателем;
- Яркий дневной светильник 6000-7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр, два цифровых гигрометра и измеритель UVI;
- Грунт глубиной 15-25 см, два укрытия и каменная площадка;
- Помповый пульверизатор;
- Мелкая тяжёлая поилка, кормовая площадка, сепия, кальций и мультивитамин.

Субстрат

15-25 см смеси грунта без удобрений, промытого игрового песка и глины примерно 50:30:20; смесь должна позволять рыть и сохранять нору. Верхний слой оставляют сухим, нижний слой прохладной половины – слегка влажным. Кокосовое волокно допустимо до 20% смеси; кокосовые чипсы, волокна осины или тополя и буковая щепа не подходят как основной грунт. Бумажные салфетки используют в карантине. Пластиковый коврик не подходит для постоянного содержания, потому что исключает рытьё. Кальцевый песок, кукурузный наполнитель, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Два укрытия, тень, камни и место для рытья.

Активность и обогащение среды

Неровный рельеф, поиск трав и закрытый уличный вольер в тёплый сезон.

Поилка

Широкая мелкая ёмкость заподлицо с грунтом.

Температура и обогрев

Поверхность площадки прогрева 34-36 °C, воздух тёплой зоны 26-30 °C, прохладной 20-24 °C, ночью 16-20 °C. Две белые лампы прогревают всё тело; датчик термостата закрепляют на высоте панциря. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Нижний обогрев и греющий камень запрещены.

Влажность

40-60%; внутри прохладного укрытия 65-75% для молоди. Если гигрометр показывает ниже 40%, утром пульверизатором увлажнить нижний слой прохладной половины, прекратив на 50-55%; верх должен остаться почти сухим. Субстрат в укрытии держать прохладным и слегка влажным. Конденсат, мокрый пластрон и затхлый запах означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

UVB и яркий дневной свет включать 12–14 часов. На площадке прогрева поддерживать UVI 3,0–4,0, в укрытии – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI.

Витамины и минеральные добавки

Сепия доступна постоянно. Щепотку кальция без D3 тонко распределять по влажной зелени: молоди 2–3 раза в неделю, взрослым 1–2 раза. Мультивитамин использовать вместо кальция дважды в месяц.

Уборка

Остатки корма и помёт ежедневно; поилка ежедневно; загрязнённый грунт ежемесячно.

Линька

Кожа на голове и лапах обновляется небольшими сухими участками; это нормально. Щитки панциря у сухопутной черепахи не должны отслаиваться пластинами. Кожу и щитки не отрывают, панцирь не смазывают. Мягкость, трещины, запах, мокнувшие участки или выраженное шелушение требуют осмотра ветеринарным врачом по экзотическим животным.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одной.

Тревожные признаки

Выделения, дыхание ртом, закрытые глаза, мягкий панцирь, потеря массы, диарея или задержка кладки.

Рацион и кормление

Ежедневно 90–100% разнотравья и листовой зелени; овощи до 10%, фрукты и животный белок не давать.

Вода

Вода постоянно; молодь замачивать 2–3 раза в неделю, взрослых раз в неделю по 15–20 минут.

Контакт и безопасность

Поднимать под пластрон двумя руками, не переворачивать.

Сезонные изменения и покой

Здоровые взрослые зимуют 8–12 недель при 4–8 °C после обследования; молодь и больных не охлаждать.

Безопасность и особые риски

Подкоп, перегрев, обезвоживание и деформация панциря.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. BSAVA Tortoises, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. British Chelonia Group, Mediterranean Tortoises - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Wildlife Center of the North Coast, Hermann's Tortoise Care Sheet, 2024 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. BSAVA Manual of Reptiles, 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Балканская черепаха · версия 4