

Уход за мраморным тараканом

Мраморный таракан

Особенности вида

Быстро размножается, хорошо лазает по гладким поверхностям и способен закрепиться в тёплом помещении.

Размер

Новорождённые 3-4 мм; взрослые самцы и самки 25-30 мм.

Продолжительность жизни

6-12 месяцев.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Тропическая Африка; тёплый влажный лесной опад, распространён человеком.

Террариум

Допустим гладкий пищевой пластиковый контейнер. Для колонии до 500 взрослых минимально допустимый размер – 60 × 40 × 40 см; комфортный – 80 × 50 × 50 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляционные окна из мелкоячеистой металлической сетки, не пропускающей самых маленьких нимф сверху и по бокам.

Оборудование террариума

- Гладкий контейнер выбранного размера с металлической сетчатой вентиляцией и фиксаторами;
- Наружный боковой термоковрик, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Яичные лотки или сетки, кормовые площадки и отдельная ёмкость для сортировки;
- Водный гель или фитильная поилка и мелкая кормовая площадка для свежих овощей;
- Второй пустой контейнер для уборки и предотвращения побега.

Субстрат

Голое дно либо 2-3 см сухих отрубей.

Укрытия и оформление

Вертикальные яичные лотки.

Активность и обогащение среды

Большая поверхность, несколько кормовых точек и сортировка.

Поилка

Водный гель; открытая вода запрещена.

Температура и обогрев

26-30 °C, ночью 22-25 °C; боковой обогрев под термостатом.

Влажность

50-70%. Ниже 50% добавить свежий водный гель и слегка увлажнить один угол, прекратив на 65%. Укрытия остаются сухими; конденсат, мокрый картон и плесень означают избыток влаги. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

10-12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Сухой полнорационный корм постоянно, овощи и зелень ежедневно; gut-loading 24-72 часа с 8-10% кальция.

Витамины и минеральные добавки

Отдельная присыпка не нужна; перед скармливанием – минеральный рацион.

Вода

Гель менять ежедневно; не купать.

Уборка

Влажный корм через 24 часа, погибших сразу, фрасс каждые 2-4 недели.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

Новая партия 30 дней отдельно.

Тревожные признаки

Массовая гибель, плесень, клещи, запах или остановка размножения.

Контакт и безопасность

Работать над вторым контейнером; использовать барьер по верхнему краю.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Побег, заселение помещения, клещи, плесень и аллергены.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. EAZA Live Food Species Manual - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Reptiles, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Finke, feeder insect nutrition - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Smithsonian National Zoo, Body by Bugs, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Blattodea Species File, Nauphoeta cinerea - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Мраморный таракан · версия 4