

Уход за томатным узкоротом

Томатный узкорот

Особенности вида

При угрозе раздувается и выделяет липкий раздражающий секрет.

Размер

После метаморфоза 1–2 см; взрослые самцы 6–8 см, самки 8–11 см.

Продолжительность жизни

8–12 лет.

Активность и режим дня

Сумеречный и ночной, роющий.

Ареал обитания

Северо-восток Мадагаскара; влажные низинные леса, болота и сады.

Террариум

Стекланный или пластиковый, горизонтальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 60 × 45 × 45 см, комфортный – от 90 × 45 × 45 см. Крышка закрывается на фиксаторы, щели недопустимы. Верхняя сетка и отверстия в верхней части боковой стены обеспечивают воздухообмен без прямого потока на лягушку; оборудование устанавливается снаружи.

Оборудование террариума

- Горизонтальный террариум выбранного размера с крышкой;
- Защищённый керамический нагреватель малой мощности с термостатом;
- Линейная UVB-лампа низкой мощности с отражателем и таймером;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Помповый пульверизатор и кондиционер от хлора и хлорамина;
- Субстрат глубиной 10–15 см, лиственный опад, пробка и два укрытия;
- Тяжёлая мелкая поилка, кормовые щипцы, кальций и мультивитамин.

Субстрат

10–15 см смеси грунта без удобрений, кокосового волокна и листового перегноя; она должна держать нору, но не выделять воду при сжатии. Кокосовые чипсы допустимы только как небольшая часть смеси. Бумажные салфетки используют в карантине. Пластиковый коврик, волокна осины или тополя и буковая щепа не подходят для постоянного содержания. Гравий, кальциевый песок, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Два затенённых участка, кора, растения и мох вне кормовой зоны.

Активность и обогащение среды

Глубокий грунт для зарывания и смена мест кормления.

Поилка

Мелкая тяжёлая ёмкость с пологим выходом.

Температура и обогрев

Воздух тёплой зоны 24–26 °C, прохладной 21–23 °C, ночью 18–22 °C. Керамический нагреватель размещают снаружи над одной стороной крыши и подключают к термостату; датчик закрепляют у поверхности грунта. Нижний обогрев запрещён: лягушка зарывается для охлаждения.

Влажность

65–85%, измерять у поверхности грунта. При показании ниже 65% опрыскать дехлорированной водой листья и прохладную половину, затем перемешать воду с нижним слоем и прекратить на 75–80%. Верх листового опада между циклами слегка подсыхает; вода при сжатии грунта не выделяется. Конденсат, болотный запах и стоячая вода означают переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов; UVB с UVI 0,5–1,0.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, дождевые черви и саранча; молодь ежедневно, взрослые 2–3 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Насекомых при большинстве кормлений поместить в закрывающуюся ёмкость с щепоткой кальция без D3, встряхнуть до тонкого покрытия и сразу скормить. Кальций с D3 и мультивитамин использовать по отдельности вместо обычного кальция дважды в месяц каждый. Выбирать мультивитамин для амфибий с готовой формой витамина А (ретинила ацетат или пальмитат). Дозировку и частоту определять по составу и инструкции; отдельный витамин А без назначения ветеринара не давать.

Вода

Дехлорированная вода постоянно, менять ежедневно.

Уборка

Помёт и погibliй корм ежедневно; поилку ежедневно; полная замена субстрата раз в 4 недели.

Контакт и безопасность

Не брать руками; влажные перчатки без пудры обязательны.

Линька

Лягушка регулярно сбрасывает очень тонкий наружный слой кожи и обычно сразу съедает его, поэтому процесс часто остаётся незаметным; это нормально. Иногда животное выгибается и проводит лапами по телу, помогая коже сойти. Кожу не снимают руками. Длительное отслаивание, покраснение, язвы или вялость требуют проверки условий содержания и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Карантин и подселение

Минимум 60 дней отдельно с тестом на хитридиомикоз; содержать по одной.

Безопасность и особые риски

Кожный секрет раздражает глаза и слизистые; после обслуживания мыть руки.

Тревожные признаки

Покраснение, отёк, судороги, истончение, отказ от корма, открытый рот или слабость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Amphibian Medicine and Captive Husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. AZA Amphibian Husbandry Resource Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. AmphibiaWeb, *Dyscophus antongillii* - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Carpenter's Exotic Animal Formulary, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. IUCN species account. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Томатный узкорот · версия 4