

Уход за мадагаскарским шипящим тараканом

Мадагаскарский шипящий таракан

Особенности вида

Бескрылый таракан; самцы шипят, выталкивая воздух через дыхальца, и имеют выраженные переднеспинные бугры.

Продолжительность жизни

2–5 лет.

Размер

Новорождённые нимфы 6–8 мм; взрослые самцы 5–8 см, самки 5–7 см.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Мадагаскар; влажный лесной опад и гниющая древесина.

Террариум

Допустим гладкий пищевой пластиковый контейнер. Для колонии до 20 взрослых минимально допустимый размер – 45 × 30 × 30 см; комфортный – 60 × 40 × 40 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Широкая верхняя и боковая, закрытая металлической сеткой.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с металлической сеткой, фиксатором и барьером от побега;
- Боковой термоковрик, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Грунт, вертикальные укрытия и кормовые площадки;
- Мелкая устойчивая поилка с безопасным наполнителем;
- Второй пустой контейнер для безопасной уборки и пересадки.

Субстрат

5–8 см почвенной смеси без удобрений, кора и лиственной опад.

Укрытия и оформление

Вертикальные пластины коры и минимум одно укрытие на несколько особей.

Активность и обогащение среды

Древесина разной фактуры, лиственной опад и рассредоточенная подача корма.

Поилка

Водный гель либо мелкая ёмкость с камнями; открытая глубокая вода запрещена.

Температура и обогрев

24–30 °C, ночью 20–24 °C; коврик сбоку под термостатом.

Влажность

60–75%. Ниже 60% слегка опрыскать один угол грунта и прекратить на 70%. Сухие укрытия сохраняют; конденсат, плесень и мокрый корм означают переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

10–12 часов рассеянного света; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Постоянно сухой полнорационный корм для насекомых; овощи и зелень 3–5 раз в неделю, фрукты до 10% свежего рациона.

Витамины и минеральные добавки

Отдельные добавки не нужны при полнорационном корме; источник кальция нужен, если тараканов используют как корм.

Вода

Водный гель менять через 1–2 дня, поилку ежедневно; не купать.

Уборка

Влажный корм через 24 часа; погибших особей и плесень сразу; грунт по участкам ежемесячно.

Контакт и безопасность

Дать перейти на руку; не сжимать и не тянуть за ноги.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

30 дней отдельно; новых особей добавлять после проверки на клещей.

Тревожные признаки

Массовая гибель, деформация после линьки, чёрные мягкие участки, клещи или резкое прекращение размножения.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Побег нимф, плесень, клещи и аллергены экскрементов.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Cincinnati Zoo invertebrate husbandry resources - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Amateur Entomologists' Society, Cockroach Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Blattodea Species File, *Gromphadorhina portentosa* - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Smithsonian/National Zoo species account - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Chapman, The Insects. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Мадагаскарский шипящий таракан · версия 4