

Уход за нигритой

Нигрита

Особенности вида

Полностью чёрная королевская змея с выраженным кормовым рефлексом и склонностью поедать других змей.

Размер

При вылуплении 20–30 см; взрослые самцы 90–120 см, самки 100–140 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный; в жаркий сезон активность смещается на ночь.

Ареал обитания

Пустыня Сонора в Мексике и южной Аризоне; сухие каменистые и кустарниковые местообитания с выраженными суточными перепадами.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтальный. Для взрослой змеи минимально допустимый размер – 90 × 45 × 55 см, комфортный – от 120 × 60 × 60 см; особи длиннее 120 см нужен комфортный террариум длиной не меньше длины тела. Крышка или дверцы закрываются на замок; щели недопустимы. Приточные отверстия размещают внизу прохладной стороны, вытяжные – сверху тёплой; отверстия должны быть уже головы змеи. Молодь содержат в меньшем контейнере с последующей заменой либо в плотно оформленном взрослом объёме.

Оборудование террариума

- Террариум подходящего по длине змеи размера и замок;
- Верхняя греющая лампа 50–75 Вт, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два тесных укрытия и влажная камера;
- Роющий субстрат, тяжёлая поилка-купалка, кора, тоннели и закреплённые низкие ветви;
- Таймер для дневного светового режима.

Субстрат

Слой 8–12 см из 60% органической почвы без удобрений и 40% промытого песка либо обеспыленной осиновой или тополевой стружки, включая лигноцел. Кокосовое волокно используют в почвенной смеси или во влажной камере; кокосовые чипсы подходят только сухими и не должны прилипать к корму. Буковая щепа плохо держит ходы и может быть проглочена с кормом. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик подходят для карантина и лечения, но не заменяют постоянный роющий слой. Кальцевый песок, кукурузный наполнитель, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия, влажная камера на период линьки, кора, устойчивые ветви и тоннели.

Активность и обогащение среды

Рыхлый грунт для рытья, разные фактуры и сменяемые запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая устойчивая ёмкость, позволяющая свернуться и погрузить тело.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 28–30 °C, воздух в тёплой зоне 24–26 °C, в прохладной 21–24 °C, ночью 18–22 °C. Лампу устанавливают над одним краем, закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на высоте тела змеи у прогрева. Температуру поверхности проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска контактного ожога.

Влажность

30–50%; измерять цифровым гигрометром в средней части прохладной половины. При показателе ниже 30% слегка увлажнить чистой водой только прохладный угол почвенной смеси. При использовании осины, тополя или лигноцела основной грунт не опрыскивать: воду вносят только в сфагнум или сложенную бумажную салфетку во влажной камере. Во время линьки внутри камеры поддерживать 65–75%. Конденсат и постоянно мокрый грунт недопустимы. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Греющая лампа и рассеянный свет помещения обеспечивают 12 часов света; следующие 12 часов террариум оставляют в темноте.

Рацион и кормление

Размороженные мыши и крысы. До 100 г: 10-15% массы каждые 5-7 дней; 100-300 г: 8-12% каждые 7-10 дней; более 300 г: 5-10% каждые 10-14 дней. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при кормлении цельными позвоночными.

Вода

Вода постоянно; менять ежедневно; плановое купание не требуется.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Мыть руки от запаха корма; не брать 48 часов после кормления и во время линьки.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Обязательная зимовка не нужна; охлаждение только для разведения.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; совместное содержание со змеями запрещено.

Безопасность и особые риски

Высокий риск побега, кормового укуса и каннибализма.

Тревожные признаки

Потеря массы, отказ от корма, рвота, дыхательные шумы, выделения, клещи, ожог, травма рта или неполная линька.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Reptiles and Research, Mexican Black Kingsnake Care Guide, ред. 2024 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. RSPCA, How to take care of your Kingsnake, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. ReptiFiles, Kingsnake Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Wiseman K. D. et al., Feeding ecology of a generalist predator, the California Kingsnake, Herpetological Conservation and Biology 14, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Нигрита · версия 5