

Уход за дальневосточной жерлянкой

Дальневосточная жерлянка

Особенности вида

При угрозе показывает яркое брюхо и выделяет раздражающий кожный секрет.

Размер

После метаморфоза 1–2 см; взрослые самцы 4–5 см, самки 5–6 см.

Продолжительность жизни

10–15 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный, полуводный.

Ареал обитания

Российский Дальний Восток, Китай и Корея; мелкие прохладные водоёмы, луга и лесные опушки умеренного муссонного климата.

Террариум

Стекланный палюдариум. Для одной взрослой особи минимум – 45 × 30 × 30 см, комфортно – от 60 × 45 × 45 см; для группы из 3–4 особей минимум – 60 × 45 × 45 см, комфортно – от 90 × 45 × 45 см. Вода занимает 50–70% площади, суша – остальную часть. Плотная вентилируемая крышка закрывается без щелей; из воды есть несколько пологих выходов.

Оборудование террариума

- Палюдариум выбранного размера с плотной крышкой;
- Фильтр с губкой на заборнике и рассеянным слабым потоком;
- Аквариумный охладитель или вентилятор с контроллером температуры;
- Линейная UVB-лампа низкой мощности с отражателем и таймером;
- Цифровые водный и воздушный термометры, цифровой гигрометр и измеритель UVI;
- Капельные тесты на аммиак, нитрит и нитрат, кондиционер от хлора и хлорамина;
- Дренаж, грунт и лиственный опад на суше, коряги и плавающие растения;
- Сифон, кормовые щипцы, кальций и мультивитамин.

Субстрат

На суше – 8–10 см смеси грунта без удобрений и кокосового волокна над дренажом, сверху лиственный опад; в воде – голое дно или тонкий слой мелкого окатанного песка. Кокосовые чипсы допустимы только в сухопутной смеси. Бумажные салфетки применяют в отдельном карантинном контейнере. Пластиковый коврик, волокна осины или тополя и буковая щепа не подходят для постоянной влажной суши. Гравий, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два укрытия на суше, плавающие растения, коряги и пологие выходы из воды.

Активность и обогащение среды

Разные глубины воды, поиск корма и густая растительность.

Поилка

Не применяется; водная часть служит поилкой и купалкой.

Температура и обогрев

Вода и воздух днём 20–24 °C, ночью 16–20 °C. В тёплом помещении используют аквариумный охладитель или вентилятор с контроллером; температура 26 °C и выше опасна.

Влажность

60–80% над сушей. При показании ниже 60% пульверизатором увлажнить лиственный опад дехлорированной водой и прекратить на 70–75%; нижний слой остаётся влажным, поверхность частично подсыхает. Стоящая вода в грунте, постоянный конденсат и затхлый запах означают избыток влаги. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов; UVB с UVI 1,0–2,0 над сушей.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, дождевые черви и личинки; молодь ежедневно, взрослые 3 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скормливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Насекомых при большинстве кормлений поместить в закрывающуюся ёмкость с щепоткой кальция без D3, встряхнуть до тонкого покрытия и сразу скормить. Кальций с D3 и мультивитамин использовать по отдельности вместо обычного кальция дважды в месяц каждый. Выбирать мультивитамин для амфибий с готовой формой витамина А (ретинила ацетат или пальмитат). Дозировку и частоту определять по составу и инструкции; отдельный витамин А без назначения ветеринара не давать.

Вода

Дехлорированная вода; аммиак и нитрит 0 мг/л, подмена 25–50% еженедельно. До заселения запустить биофильтр и подтвердить тестами устойчивую переработку отходов: аммиак и нитрит – 0 мг/л. После заселения регулярно контролировать качество воды.

Уборка

Погибший корм и помёт ежедневно; фильтр по потоку; загрязнённый грунт ежемесячно.

Контакт и безопасность

Не брать руками; использовать влажные перчатки без пудры.

Линька

Лягушка регулярно сбрасывает очень тонкий наружный слой кожи и обычно сразу съедает его, поэтому процесс часто остаётся незаметным; это нормально. Иногда животное выгибается и проводит лапами по телу, помогая коже сойти. Кожу не снимают руками. Длительное отслаивание, покраснение, язвы или вялость требуют проверки условий содержания и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; охлаждение только для разведения.

Карантин и подселение

Минимум 60 дней отдельно с тестом на хитридиомикоз и ранами; совместно только особей одного вида сходного размера.

Безопасность и особые риски

Кожный секрет раздражает слизистые; не содержать с другими амфибиями.

Тревожные признаки

Покраснение, язвы, отёк, судороги, истончение, отказ от корма или нарушение плавания.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Amphibian Medicine and Captive Husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. AZA Amphibian Husbandry Resource Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. AmphibiaWeb, Bombina orientalis - актуальная видовая и таксономическая запись
5. Carpenter's Exotic Animal Formulary, 2023 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. EAZA Amphibian TAG guidance. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding
8. Royal Veterinary College, Aquarium health and nitrogen cycle (2024) - Establishing an aquarium; Testing for toxins

Дальневосточная жерлянка · версия 4