

Уход за плетевидкой

Плетевидка

Особенности вида

Тонкая древесная заднебороздчатая змея с горизонтальным зрачком; питается преимущественно ящерицами и лягушками.

Размер

При рождении 25–35 см; взрослые самцы 120–170 см, самки 120–180 см.

Продолжительность жизни

8–12 лет.

Активность и режим дня

Дневной; почти всё время проводит на ветвях.

Ареал обитания

Южная и Юго-Восточная Азия; влажные тропические леса, кустарники и лесные опушки.

Террариум

Стекло или влагостойкий пластик, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой змеи – 90 × 60 × 90 см, комфортный – от 120 × 60 × 120 см. Дверцы закрываются на замок; щели и зазоры у кабелей недопустимы. Широкий приток воздуха располагают внизу, вытяжку – в верхней крышке; при слабом естественном движении воздуха устанавливают маломощный вентилятор снаружи за мелкой защитной сеткой. Светильники и нагреватели отделяют сеткой от ветвей.

Оборудование террариума

- Вертикальный влагостойкий террариум выбранного размера и замок;
- Верхняя лучистая панель или керамический нагреватель без света, защитная сетка и термостат;
- Яркий дневной светильник и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Автоматическая дождевальная установка с гигростатом и ручной опрыскиватель;
- Дренаж, влагоёмкий субстрат и лиственный опад;
- Густая растительность, горизонтальные и диагональные ветви диаметром 1–3 см;
- Наземная и закреплённая на ветвях поилка.

Субстрат

Дренажный слой закрывают сеткой и укладывают 8–12 см смеси из 50% органической почвы без удобрений, 30% кокосового волокна и 20% кокосовых чипсов; сверху добавляют сухой лиственный опад. Нижний слой удерживает влагу, поверхность просыхает между дождями. Бумажные салфетки используют в карантине. Цельный пластиковый коврик не удерживает нужную влажность и не подходит для постоянного растительного террариума. Осина, тополь, лигноцел и буковая щепа при 60–80% влажности быстро намокают и плесневеют. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Плотные живые или искусственные растения, минимум два закрытых участка кроны, горизонтальные и диагональные ветви диаметром 1–3 см.

Активность и обогащение среды

Непрерывные маршруты в кроне, капли воды на листьях, смена безопасных ветвей и визуальные барьеры.

Поилка

Одна устойчивая наземная и одна поднятая ёмкость; дополнительно ежедневное дождевание листьев.

Температура и обогрев

Ветвь прогрева 29–31 °C, воздух в средней части 24–28 °C, прохладная зона 22–24 °C, ночью 21–23 °C. Нагреватель устанавливают только сверху за сеткой и подключают к термостату; датчик закрепляют рядом с верхней ветвью, но вне прямого луча. Температуру поверхности проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Нижний обогрев не создаёт нужного древесной змее градиента; греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

60–80% с кратким подъёмом до 85–90% после дождевания; измерять гигрометрами в средней части и у верхних ветвей. При показателе ниже 60% опрыскать листья и ветви питьевой водой либо включить дождевальную установку через гигростат до 80–85%; после этого поверхность листьев и верх грунта должны просохнуть. Постоянный туман, мокрый грунт и конденсат на всех стенках недопустимы. Резервуар, форсунки и трубки мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Яркий дневной светильник включать таймером на 12 часов; в кроне должны оставаться затенённые участки. Следующие 12 часов обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Выращенные в неволе мелкие ящерицы и лягушки; рыба и грызуны не составляют постоянный рацион. Молодь: один кормовой объект 10–15% массы каждые 4–5 дней; взрослые: 8–12% каждые 7–10 дней. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при кормлении цельными позвоночными; кормовых насекомых при временном использовании опылять кальцием без D3.

Вода

Ежедневно опрыскивать листья питьевой водой; поилки менять ежедневно; принудительное купание не требуется.

Уборка

Загрязнения удалять ежедневно; поилки мыть ежедневно; стекло и ветви очищать еженедельно, полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Контакт минимальный; перемещать на ветви или крюке, не сжимать тонкое тело и не подносить к лицу.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; сезон дождей имитировать только при разведении.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно с повторным исследованием кала; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Укус может вызвать боль и отёк; корм только из контролируемой разводной колонии, диких амфибий и ящериц не использовать.

Тревожные признаки

Обезвоживание, отказ держаться на ветвях, падения, дыхательные шумы, отёк рта, потеря массы, рвота, клещи или неполная линька.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Rare Colubrids, Ahaetulla prasina Husbandry and Breeding, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Zoological Park Organization of Thailand, Oriental Whip Snake species account - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Kubiak M., Handbook of Exotic Pet Medicine, 2020 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Плтевидка · версия 5