

Уход за сетчатым питоном

Сетчатый питон

Особенности вида

Один из крупнейших и наиболее сильных питонов; быстро обучается режиму обслуживания и требует защищённого контакта.

Размер

При вылуплении 60–75 см; взрослые самцы 300–450 см, самки 400–600 см и более.

Продолжительность жизни

20–25 лет.

Активность и режим дня

Преимущественно сумеречный и ночной; хорошо плавает и лазает.

Ареал обитания

Южная и Юго-Восточная Азия; влажные леса, речные долины, болота и сельскохозяйственные территории тропического климата.

Террариум

Отдельное прочное помещение из влагостойких панелей, армированного стекла в металлической раме или промышленного пластика. Для змеи длиной 3 м и более минимальные длина и ширина пола составляют 2/3 и 1/2 длины тела, высота – 1/2 длины тела, но не более 2,2 м. Комфортный размер позволяет полностью вытянуться; ширина составляет не меньше половины длины тела, высота – половину длины тела до предела 2,2 м. Например, для змеи 4 м минимум – 270 × 200 × 200 см, комфортный размер – от 400 × 200 × 200 см. Вход выполняют через защищённый тамбур; двери имеют два независимых замка. Щели недопустимы. Металлические приточные решётки располагают внизу, вытяжные – вверх; все решётки и светильники должны выдерживать давление змеи.

Оборудование террариума

- Помещение рассчитанного по длине змеи размера, защищённый тамбур и два замка;
- Верхние лучистые панели или обогрев помещения, основной и резервный термостаты, защитные решётки и сигнализация выхода температуры за диапазон;
- Минимум два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Два прочных укрытия, закрываемых снаружи, и изолируемый транспортный контейнер;
- Моющийся пол или субстрат, стационарный бассейн со сливом, нескользкий вход;
- Закреплённые брёвна, полки и визуальные барьеры;
- Дневной светильник и таймер.

Субстрат

Основной вариант для крупной змеи – герметичный нескользкий моющийся пол и одна или несколько закреплённых ёмкостей со слоем 10–15 см кокосовых чипсов, кипарисовой мульчи либо почвенно-кокосовой смеси. В полностью грунтовом помещении эти материалы укладывают по всей доступной площади и меняют загрязнёнными участками. Бумажные листы допустимы в карантинном помещении. Целые пластиковые или резиновые коврики допустимы только без петель, зазоров и доступных краёв; нужны сменные секции для мойки и полного высыхания. Осина, тополь, лигноцел и буковая щепка не используются при влажности 60–80% из-за намокания, плесени и риска проглатывания. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и чистый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два прочных укрытия, закрывающихся снаружи; толстые закреплённые брёвна, полки и визуальные барьеры.

Активность и обогащение среды

Крупные лазательные конструкции, бассейн, смена маршрутов, запаховые следы и защищённая тренировка добровольного перехода в транспортный контейнер.

Поилка

Стационарный бассейн, позволяющий погрузить всё тело; слив и нескользкий вход обязательны.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 31–33 °С, воздух в прохладной зоне 25–27 °С, ночью 23–26 °С. Обогрев создают верхними лучистыми панелями либо отоплением помещения с отдельной тёплой зоной. Все нагреватели закрывают металлическими решётками; основной термостат ограничивает рабочую температуру, резервный отключает систему при перегреве, сигнализация сообщает о выходе за диапазон. Датчики закрепляют вне доступа змеи, но на высоте её тела; показания сравнивают с независимыми термометрами. Коврики и греющие камни запрещены.

Влажность

60–80%; измерять двумя цифровыми гигрометрами в средней части помещения и у прохладного укрытия. При показателе ниже 60% небольшими порциями увлажнить нижний слой кокосового или почвенно-кокосового субстрата либо включить внешний комнатный увлажнитель через гигростат до возвращения показателя в диапазон. Верхний слой пола должен оставаться без луж; постоянный конденсат, мокрая поверхность и затхлый запах означают переувлажнение. Резервуар и воздуховод увлажнителя мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Дневной светильник включать таймером на 12 часов; следующие 12 часов обеспечивать полную темноту. Все светильники закрывать прочной металлической решёткой.

Рацион и кормление

Только заранее умерщвлённые цельные грызуны, кролики или птица. До 5 кг: 7–10% массы каждые 10–14 дней; 5–20 кг: 5–7% каждые 14–21 день; более 20 кг: 3–5% каждые 21–35 дней. Массу и кондицию фиксировать ежемесячно. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при разнообразных цельных кормовых объектах.

Вода

Чистая питьевая вода и бассейн доступны постоянно; воду менять ежедневно и после дефекации.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; бассейн мыть после каждого загрязнения; полная санитарная обработка по графику не реже раза в 4 недели.

Контакт и безопасность

С особями до 2 м работает один подготовленный человек; свыше 2 м – минимум двое. Змею не размещать на шее и не оставлять руки в пределах кормового броска.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; сезонные изменения применяют только в программе разведения.

Карантин и подселение

Не менее 90 дней в отдельном блоке с отдельной вентиляцией и инвентарём; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Крупная особь опасна укусом и сдавливанием; перед открытием террариума отделять кормовой контекст, использовать разделительный щит и держать второго сотрудника рядом.

Тревожные признаки

Дыхательные шумы, выделения, отказ от корма с потерей массы, рвота, ожог, клещи, повреждение рта, пролапс, неполная линька или нарушение координации.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Wild Welfare, Care for Us: Reticulated Python, 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. ReptiCare, Reticulated Python, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Сетчатый питон · версия 5