

Уход за среднеазиатской черепахой

Среднеазиатская черепаха

Особенности вида

Имеет четыре пальца на передних лапах и активно роет глубокие норы.

Размер

При вылуплении 3-4 см по карапаксу; взрослые самцы 13-20 см, самки 18-25 см.

Продолжительность жизни

40-60 лет.

Активность и режим дня

Дневной; активнее утром и вечером.

Ареал обитания

Средняя Азия, Иран, Афганистан, Пакистан и Казахстан; сухие степи и полупустыни с холодной зимой.

Террариум

Непрозрачный открытый стол или напольный загон. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 210 × 110 × 60 см, комфортный – от 300 × 150 × 60 см. Верх открыт, но над ним нет сквозняка. Гладкие стенки без щелей заглубляют в грунт минимум на 30 см либо соединяют с герметичным дном; высота исключает перелезание. Лампы крепят сверху вне досягаемости.

Оборудование террариума

- Открытый непрозрачный загон выбранного размера;
- Две белые галогенные лампы прогрева с термостатом и защитными сетками;
- Линейная T5 UVB-лампа 10-12% с отражателем;
- Яркий дневной светильник 6000-7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр, два цифровых гигрометра и измеритель UVI;
- Грунт глубиной 15-30 см, два укрытия и каменная площадка;
- Помповый пульверизатор;
- Мелкая тяжёлая поилка, кормовая площадка, сепия, кальций и мультивитамин.

Субстрат

15-30 см смеси грунта без удобрений, промытого игрового песка и глины примерно 40:40:20; смесь должна держать нору. Утрамбованный верх оставляют сухим, нижний слой прохладной половины – слегка влажным. Кокосовое волокно допустимо до 20% смеси, кокосовые чипсы – только единично под листовым опадом. Бумажные салфетки используют в карантине. Пластиковый коврик, волокна осины или тополя и буковая щепка не подходят для постоянного содержания, потому что не позволяют строить устойчивые норы. Кальцевый песок, кукурузный наполнитель, сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два укрытия, глубокая нора, камни и теневая зона.

Активность и обогащение среды

Рытьё, перепады рельефа, поиск съедобных трав и безопасный уличный выгул в закрытом вольере.

Поилка

Широкая мелкая ёмкость заподлицо с грунтом; черепаха легко входит и выходит.

Температура и обогрев

Поверхность широкой площадки прогрева 34-36 °C, воздух тёплой зоны 26-30 °C, прохладной 20-24 °C, ночью 16-20 °C. Две белые лампы должны прогревать всё тело; датчик термостата закрепляют на высоте панциря. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Нижний обогрев и греющий камень запрещены: черепаха зарывается для охлаждения.

Влажность

Взрослым 30-50%, молодым 40-60%; внутри прохладного укрытия 60-75%. Если общий гигрометр ниже нижней границы, утром пульверизатором увлажнить прохладную половину и перемешать воду с нижним слоем, прекратив на 45-50% у взрослой или 55-60% у молодой черепахи. В укрытии субстрат держат прохладным и слегка влажным. Мокрая поверхность, конденсат и затхлый запах означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

UVB и яркий дневной свет включать 14 часов летом и 10 часов зимой. На площадке прогрева поддерживать UVI 3,0–4,0, в укрытии – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI.

Витамины и минеральные добавки

Сепия доступна постоянно. Щепотку кальция без D3 тонко распределять по влажной зелени: молоди 2–3 раза в неделю, взрослым 1–2 раза. Мультивитамин использовать вместо кальция дважды в месяц.

Уборка

Остатки корма и помёт ежедневно; поилку ежедневно; полная замена загрязнённых участков ежемесячно.

Линька

Кожа на голове и лапах обновляется небольшими сухими участками; это нормально. Щитки панциря у сухопутной черепахи не должны отслаиваться пластинами. Кожу и щитки не отрывают, панцирь не смазывают. Мягкость, трещины, запах, мокнувшие участки или выраженное шелушение требуют осмотра ветеринарным врачом по экзотическим животным.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно с анализом кала; содержать по одной.

Тревожные признаки

Выделения из носа, дыхание ртом, закрытые глаза, мягкий панцирь, потеря массы, диарея, отказ от прогрева или задержка кладки.

Рацион и кормление

Ежедневно 90–100% разнотравья и листовой зелени с высоким содержанием клетчатки; овощи до 10%, фрукты и животный белок не давать.

Вода

Вода постоянно; молодь замачивать 15–20 минут 2–3 раза в неделю, взрослых раз в неделю.

Контакт и безопасность

Поднимать двумя руками под пластрон, не переворачивать и не ронять.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не обязательна; только здоровому взрослому животному после обследования, при 4–8 °C и контроле массы.

Безопасность и особые риски

Побег через подкоп, перегрев, травма стеклом и деформация панциря.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Russian Tortoise Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Phoenix Herpetological Society, Russian Tortoise Care Guide, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Aurora Animal Hospital, Russian Tortoise Care, 2020 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. British Chelonia Group, Mediterranean Tortoises Care Sheet - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Divers S. J., Stahl S. J., eds., Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Girling S. J., Raiti P., eds., BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Warwick C. et al., eds., Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Среднеазиатская черепаха · версия 4