

Уход за тлилютокатлем курчавоволосым

Тлилютокатль курчавоволосый

Особенности вида

Наземно-роющий птицеяд с густыми курчавыми волосками.

Размер

Паучок 0,8–1,5 см; взрослые самцы 12–15 см, самки 13–16 см.

Продолжительность жизни

Самцы 4–6 лет, самки 15–20 лет.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Никарагуа и Коста-Рика; сезонно-влажные тропические леса.

Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Минимально допустимый размер – 30 × 30 × 25 см; комфортный – 45 × 30 × 30 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция перекрёстная.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с фиксатором;
- Цифровой термометр и гигрометр;
- Подготовленный грунт указанной глубины, укрытие и закреплённые элементы оформления;
- Устойчивая мелкая поилка;
- Длинный пинцет, прозрачный ловчий контейнер и плотная переносная ёмкость.

Субстрат

12–18 см уплотнённой почвенной смеси; нижний слой слегка влажный.

Укрытия и оформление

Тесное укрытие и начатая нора.

Активность и обогащение среды

Глубокий грунт, кора и лиственный опад.

Поилка

Мелкая устойчивая ёмкость постоянно.

Температура и обогрев

22–26 °C, ночью 20–22 °C; нижний коврик и камень запрещены.

Влажность

65–75%. Гигрометр размещают у грунта. Ниже 65% налить воду вдоль одной стенки, увлажнив нижний слой, и прекратить на 70–75%. Поверхность частично просыхает; конденсат, плесень и болотный запах означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Слабый свет 10–12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы и саранча; молодь 2–3 раза, взрослые раз в неделю.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Воду менять 2–3 раза в неделю; не купать.

Уборка

Остатки через 24 часа; плесень и болюс сразу.

Контакт и безопасность

Руками не брать; перемещать контейнером.

Линька

Перед линькой паук обычно отказывается от корма, становится менее активным, закрывается в укрытии или плетёт линиялочный коврик. Он может лечь на спину и долго не двигаться – это нормальная поза, переворачивать его нельзя. Сам выход из старого экзоскелета занимает от 15 минут до суток; новый покров и хелицеры затвердевают постепенно. На всём этом этапе живой корм удаляют, паука не трогают и не увлажняют напрямую. Корм возвращают только после полного затвердевания хелицер и потемнения клыков: у взрослого это часто занимает 7–14 дней или дольше. По одному календарному сроку готовность не определяют. Застревание в старом покрове, повреждение или вытекание гемолимфы требуют обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным; старый покров не снимают руками.

Во время линьки питомца не трогать.

Во время линьки питомца не кормить.

Убрать живой корм, не тревожить паука и дожидаться полного затвердевания нового покрова.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Карантин и подселение

60 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Раздражающие волосы, падение и переувлажнение.

Тревожные признаки

Поджатые ноги, сморщенное брюшко, гемолимфа, плесень или застревание в линьке.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. RVC Tarantula Care, 2024 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. EAZA Cyrtopholis BPG, 2021 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. University of Illinois Tarantula Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. World Spider Catalog - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Foelix, Biology of Spiders. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Tree of Life Exotic Pet Medical Center, Tarantula Care - Molting; post-molt feeding

Глилькокатель курчавоволосый · версия 5