

Уход за йеменским хамелеоном

Йеменский хамелеон

Особенности вида

Выраженный высокий шлем; пьёт преимущественно капли с листьев и плохо переносит частый контакт.

Размер

При вылуплении 5-7 см; взрослые самцы 40-55 см, самки 25-35 см.

Продолжительность жизни

Самцы 5-8 лет, самки 3-5 лет.

Активность и режим дня

Дневной, древесный.

Ареал обитания

Йемен и юго-запад Саудовской Аравии; горные долины, кустарники и сельскохозяйственные зоны с сухим днём и влажной прохладной ночью.

Террариум

Сетчатый или гибридный, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 60 × 60 × 120 см, комфортный – от 90 × 60 × 120 см. Дверцы закрываются на фиксатор; щели недопустимы. Крыша и не менее одной боковой стены выполняются из сетки, а в гибридном корпусе предусматриваются нижние приточные и верхние вытяжные отверстия. Лампы устанавливают снаружи над сеткой. Дно делают герметичным, с уклоном к сливу и съёмным поддоном.

Оборудование террариума

- Вертикальный сетчатый или гибридный террариум выбранного размера с фиксатором;
- Белая дневная греющая лампа 40-75 Вт и диммирующий термостат;
- Линейная T5 UVB-лампа 5-6% с отражателем и целевым UVI 2,5-3,0;
- Яркий дневной светильник 6000-7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Автоматическая дождевальная установка, капельница и дренажный поддон;
- Внешний прохладный увлажнитель с гигростатом для ночного цикла;
- Безопасные живые растения и горизонтальные ветви диаметром 1-3 см;
- Кормовая чашка, кормовые щипцы, кальций и мультивитамин для рептилий;
- Для самки – непрозрачная ёмкость с грунтом глубиной 25-30 см для кладки.

Субстрат

Основной вариант – герметичное гладкое дно с уклоном к сливу и съёмным моющимся поддоном. Цельный непористый пластиковый коврик допустим как съёмная вкладка, если под ним не застаивается вода и есть второй комплект для мойки и высыхания. В биологической системе почвенно-кокосовую смесь закрывают плотной корневой сеткой и растениями, чтобы хамелеон не заглатывал частицы. Бумажные салфетки используют в карантине и меняют после намочения. Свободная древесная щепа, включая осину, тополь, лигностел и бук, не подходит из-за проглатывания и плесени. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Густые безопасные живые растения, горизонтальные ветви 1-3 см, закрытая крона и свободная ветвь прогрева.

Активность и обогащение среды

Непрерывные маршруты в кроне, кормление с разных ветвей и визуальные барьеры.

Поилка

Капельница и автоматическое дождевание; стоячая поилка не является основным источником воды.

Температура и обогрев

Поверхность ветви прогрева 29-32 °C для самца и 27-29 °C для самки; воздух в средней части 22-26 °C, внизу 20-23 °C, ночью 17-21 °C. Лампу размещают над сеткой и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на ветви на высоте спины. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

Днём 40–55%, ночью 80–100%; измерять в средней части кроны и внизу. Вечером после выключения ламп и утром до их включения дождевальную систему запускают на 2–5 минут, чтобы полностью смочить листья и оставить питьевые капли. Ночью при температуре не выше 21 °C прохладный увлажнитель включают через гигростат до 80–100% и выключают до включения света. Днём листья и ветви должны полностью высохнуть; постоянный конденсат недопустим. Для систем используют очищенную воду, резервуары и трубки моют и дезинфицируют еженедельно. Воду в указанную влажную зону вносят небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу и яркий дневной свет включать на 12 часов. На ветви прогрева поддерживать UVI 2,5–3,0, в густой листве – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, саранча, шелкопряды и другие выращенные кормовые насекомые. До 6 месяцев 8–12 мелких насекомых ежедневно; 6–12 месяцев 5–8 через день; взрослым 3–5 насекомых 3 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Кальций без D3 используют при большинстве кормлений; кальций с D3 – дважды в месяц; мультивитамин – дважды в месяц вместо обычного кальция. Насекомых помещают в закрывающуюся ёмкость, добавляют щепотку нужного порошка, осторожно встряхивают до тонкого покрытия и сразу скармливают. D3 и мультивитамин применяют с учётом UVB и состава препарата. Если мультивитамин уже содержит D3 или витамин A, не дублировать их другими добавками; соблюдать дозировку производителя.

Вода

Дождевание утром и вечером по 2–5 минут с полным просыханием между циклами; купание не требуется.

Уборка

Помёт и погибший корм ежедневно; дренаж проверять ежедневно; поверхности мыть еженедельно.

Контакт и безопасность

Контакт только при необходимости; дать самостоятельно перейти на руку или ветвь, не хватать сверху.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съесть отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; ночное охлаждение обязательно круглый год.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному и без визуального контакта с другими хамелеонами.

Безопасность и особые риски

Самки откладывают неоплодотворённые яйца; постоянно доступен контейнер с влажным грунтом глубиной 25–30 см.

Тревожные признаки

Закрытые днём глаза, запавшие глаза, слабый хват, падения, отёк суставов, мягкая челюсть, одышка, отказ от корма или задержка кладки.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Zayas M., DVM, Veiled Chameleon Care Sheet, PetMD, 2023 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Magnuson M., DVM, Introduction to Chameleon Care, 2022 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. VCA Animal Hospitals, Care and Housing for Chameleons, ред. 2023 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Chicago Exotics Animal Hospital, Veiled Chameleon Care, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Chameleon Academy, Veiled Chameleon Care Summary, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Baines et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019. - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
9. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding
10. Zoo Med, ReptiVite with D3 - Ingredients; guaranteed analysis (vitamins A and D3)

Йеменский хамелеон · версия 5