

Уход за гекконом токи

Геккон токи

Особенности вида

Территориальный древесный геккон с очень сильным укусом и громкой вокализацией.

Размер

При вылуплении 8-10 см; взрослые самцы 30-40 см, самки 25-35 см.

Продолжительность жизни

15-20 лет.

Активность и режим дня

Ночной, древесный.

Ареал обитания

Южная и Юго-Восточная Азия; влажные тропические леса, скалы и постройки.

Террариум

Стекланный или пластиковый, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи - 45 × 45 × 90 см, комфортный - от 60 × 60 × 120 см. Дверца закрывается на замок, кабельные отверстия перекрываются, щели недопустимы. Сетчатая крыша и нижние передние отверстия создают движение воздуха снизу вверх. Лампы располагают снаружи над сеткой.

Оборудование террариума

- Вертикальный террариум выбранного размера с замком;
- Белая дневная греющая лампа с диммирующим термостатом;
- Защищённый керамический нагреватель с отдельным термостатом для ночи;
- Линейная T5 UVB-лампа низкой мощности с отражателем и таймером;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр, цифровой гигрометр и измеритель UVI;
- Ручной помповый опрыскиватель;
- Не менее двух вертикальных пробковых трубок, ветви и густая листва;
- Поднятая поилка, кормовые щипцы, кальций и мультивитамин;
- Влагодёмкий субстрат и дренаж.

Субстрат

8-12 см смеси грунта без удобрений и кокосового волокна примерно 60:40 над дренажом, сверху лиственной опад. Кокосовые чипсы и мелкая безопасная кора допустимы как часть смеси. Бумажные салфетки используют в карантине. Цельный пластиковый коврик допустим только как временный моющийся настил с отдельной влажной камерой; волокна осины или тополя и буковая щепа не подходят для влажного тропического террариума. Сосновая и кедровая стружка запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два вертикальных укрытия, пробковые трубки, плотная листва и ветви по всему объёму.

Активность и обогащение среды

Непрерывные вертикальные маршруты, разные фактуры коры и кормовые точки на высоте.

Поилка

Устойчивая поднятая ёмкость и ежедневные капли воды на листьях.

Температура и обогрев

Поверхность верхней ветви 32-35 °C, воздух наверху 27-30 °C, внизу 23-26 °C, ночью 22-25 °C. Дневную лампу ставят над одной стороной крыши; ночной керамический нагреватель поддерживает нижнюю границу без света. Каждый нагреватель подключают к отдельному термостату, датчики закрепляют на ближайших доступных ветвях. Все источники внутри корпуса закрывают сеткой. Греющий камень запрещён.

Влажность

60-80%, с вечерним подъёмом и дневным просыханием. Вечером пульверизатором полностью смачивать листья, стенки и прохладную часть грунта до 75-80%; утром повторять только при показании ниже 60%. Верхний слой и листья должны частично высохнуть до следующего цикла. Постоянный конденсат, мокрый грунт и затхлый запах означают избыток влаги.

Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу включать на 12 часов; на ближайшей верхней ветви поддерживать UVI 1,0–2,0, в трубках и листе – 0. Расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать темноту.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, саранча, шелкопряды и другие выращенные кормовые насекомые. Молодь кормить ежедневно, взрослых – через день; за одно кормление давать столько насекомых не крупнее головы геккона, сколько он съедает за 5 минут, остатки удалить. Кормовых насекомых перед скормливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Насекомых при большинстве кормлений помещать в закрывающуюся ёмкость с щепоткой кальция без D3, встряхивать до тонкого покрытия и сразу скормливать. Кальций с D3 и мультивитамин использовать по отдельности вместо обычного кальция дважды в месяц каждый.

Вода

Опрыскивать вечером, воду менять ежедневно; купание не требуется.

Уборка

Помёт и погибший корм ежедневно; стекло еженедельно; полная уборка раз в 4 недели.

Контакт и безопасность

Руками не брать; для перемещения закрыть входы пробковой трубки и перенести её в закрытый контейнер.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Сильный укус, побег и автотомия хвоста.

Тревожные признаки

Потеря массы, слабый хват, мягкая челюсть, задержка линьки, выделения, диарея или вялость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Tokay Gecko Care Sheet, ред. 2022 и актуальная веб-версия - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Smithsonian's National Zoo, Tokay Gecko species account - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Orange Grove Animal Hospital, Tokay Gecko Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Hudson Valley Reptile & Rescue, Tokay Gecko Care Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Baines F. M. et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. Divers S. J., Stahl S. J., eds., Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Girling S. J., Raiti P., eds., BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019. - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
8. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Геккон токи · версия 4