

Уход за туркменским тараканом

Туркменский таракан

Особенности вида

Очень быстрый бегун; самки откладывают оотеки, самцы имеют развитые крылья.

Размер

Новорождённые 3-4 мм; взрослые самцы 22-28 мм, самки 20-25 мм.

Продолжительность жизни

4-8 месяцев.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Центральная Азия, Кавказ и Ближний Восток; сухие тёплые местообитания и постройки.

Террариум

Допустим гладкий пищевой пластиковый контейнер. Для колонии до 500 взрослых минимально допустимый размер – 60 × 40 × 40 см; комфортный – 80 × 50 × 50 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляционные окна из крупной сетки на крышке и верхних стенках.

Оборудование террариума

- Гладкий контейнер выбранного размера с металлической сетчатой вентиляцией и фиксаторами;
- Наружный боковой термоковрик, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Яичные лотки или сетки, кормовые площадки и отдельная ёмкость для сортировки;
- Водный гель или фитильная поилка и отдельный слегка влажный угол для оотек;
- Второй пустой контейнер для уборки и предотвращения побега.

Субстрат

Голое дно или 2-3 см отрубей; для оотек отдельный слегка влажный угол.

Укрытия и оформление

Вертикальные яичные лотки.

Активность и обогащение среды

Большая поверхность, несколько кормовых точек и сортировка по размеру.

Поилка

Водный гель или фитиль; открытая вода запрещена.

Температура и обогрев

28-32 °C, ночью 24-26 °C; боковой обогрев под термостатом.

Влажность

30-50%; отдельный угол для оотек 60-70%. Ниже 30% добавить свежий водный гель; угол для оотек увлажнить шприцем и прекратить на 65%. Остальной контейнер остаётся сухим; конденсат недопустим. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

10-12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Сухой полнорационный корм постоянно, овощи и зелень ежедневно; gut-loading 24-72 часа с 8-10% кальция.

Витамины и минеральные добавки

Отдельная присыпка не нужна; перед скармливанием – минеральный рацион.

Вода

Гель или фитиль менять ежедневно; не опрыскивать всю колонию.

Уборка

Влажный корм через 24 часа, погибших сразу, фрасс каждые 2-4 недели.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

Новая партия 30 дней отдельно.

Тревожные признаки

Массовая гибель, плесень, клещи, запах, деформация или отсутствие оотек.

Контакт и безопасность

Работать только над вторым контейнером; крышку закрывать сразу.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Быстрый побег, закрепление в помещении, плесень, клещи и аллергены.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. EAZA Live Food Species Manual - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Reptiles, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Finke, feeder insect nutrition - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Smithsonian National Zoo, Body by Bugs, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Blattodea Species File, Shelfordella lateralis - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Туркменский таракан · версия 4