

Уход за двупятнистым сверчком

Двупятнистый сверчок

Особенности вида

Крупнее и агрессивнее домашнего сверчка; при скученности быстро развивается каннибализм.

Размер

При вылуплении 2-3 мм; взрослые самцы 25-30 мм, самки 28-35 мм.

Продолжительность жизни

2-3 месяца.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Африка и Южная Азия; тёплые сухие луга и синантропные местообитания.

Террариум

Допустим гладкий пищевой пластиковый контейнер. Для колонии до 500 взрослых минимально допустимый размер – 60 × 40 × 40 см; комфортный – 80 × 50 × 50 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляционная сетка занимает не менее 30% площади крышки; дополнительно нужны две боковые сетчатые зоны.

Оборудование террариума

- Гладкий контейнер выбранного размера с металлической сетчатой вентиляцией и фиксаторами;
- Наружный боковой термоковрик, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Яичные лотки или сетки, кормовые площадки и отдельная ёмкость для сортировки;
- Водный гель или фитильная поилка и отдельный контейнер с влажным грунтом для яиц;
- Второй пустой контейнер для уборки и предотвращения побега.

Субстрат

Голое дно; отдельный закрытый сеткой лоток с 3-5 см влажной почвенно-песчаной смеси для яиц.

Укрытия и оформление

Вертикальные яичные лотки с широкими проходами.

Активность и обогащение среды

Несколько кормовых точек, большая поверхность и разделение по размеру.

Поилка

Водный гель или фитиль; открытая вода запрещена.

Температура и обогрев

Днём 28-32 °C, ночью 24-26 °C; боковой обогрев под термостатом.

Влажность

В колонии 40-50%; в отдельном контейнере с субстратом для яиц 70-80%. Ниже 40% добавить свежий водный гель; яичный субстрат увлажнить шприцем и прекратить на 75%. Конденсат и мокрый корм недопустимы. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Сухой полнорационный корм постоянно, зелень и овощи ежедневно; gut-loading 24-72 часа рационом с 8-10% кальция.

Витамины и минеральные добавки

В племенной колонии не нужны; перед скормливанием – специализированный минеральный рацион.

Вода

Гель или фитиль менять ежедневно; не опрыскивать.

Уборка

Погибших и влажный корм ежедневно, фрасс еженедельно, санитарная обработка между поколениями.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

Новая партия 14 дней отдельно; возрастные группы разделять.

Тревожные признаки

Массовая гибель, запах аммиака, влажный фрасс, клещи, плесень или прекращение яйцекладки.

Контакт и безопасность

Работать над вторым контейнером; перчатки и маска при пыли.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Укусы, побег, каннибализм, клещи и аллергены.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. EAZA Live Food Species Manual - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Reptiles, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Finke, feeder insect nutrition - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Smithsonian National Zoo, Body by Bugs, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Orthoptera Species File, Gryllus bimaculatus - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Двупятнистый сверчок · версия 4