

Уход за западноафриканской улиткой

Западноафриканская улитка

Особенности вида

Одновременный гермафродит; откладывает немного, но очень крупных яиц.

Продолжительность жизни

8–12 лет.

Размер

При вылуплении раковина 1–2 см; взрослые особи 12–20 см, разделения на самцов и самок нет.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Западная Африка; влажные тропические леса и плантации.

Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Для одной взрослой особи минимально допустимый размер – 45 × 30 × 30 см; комфортный – 60 × 45 × 40 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция мелкая перекрёстная без пересушивания.

Оборудование террариума

- Низкий террариум выбранного размера с фиксатором;
- Термоковрик для наружной боковой установки, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Помповый пульверизатор с подготовленной водой;
- Грунт указанной глубины, укрытие, кормовая площадка и источник кальция;
- Две тяжёлые мелкие ёмкости для воды и корма.

Субстрат

12–18 см влажной почвы без удобрений или кокосового волокна, pH 6,5–8,0.

Укрытия и оформление

Пробковая кора, лиственный опад и мягкие низкие предметы; камни запрещены.

Активность и обогащение среды

Глубокий грунт и разнообразные кормовые точки.

Поилка

Очень мелкая устойчивая ёмкость.

Температура и обогрев

24–28 °C; коврик только сбоку под термостатом, нижний обогрев запрещён.

Влажность

75–90%. Ниже 75% опрыскать стенки и половину грунта подготовленной водой и прекратить на 85%. Грунт не выделяет воду при сжатии; постоянный конденсат и кислый запах означают переувлажнение. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Рассеянный свет 10–12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Ежедневно зелень и овощи; фрукты до 10%, белковый корм 1–2 раза в неделю. Соль, цитрусы, лук и обработанные продукты запрещены.

Витамины и минеральные добавки

Сепия или карбонат кальция постоянно; витамины не нужны.

Вода

Дехлорированную воду менять ежедневно; под струей не купать.

Уборка

Остатки и помёт ежедневно; заменять не более четверти грунта; без моющих средств.

Контакт и безопасность

Брать влажными руками под подошву; не тянуть за раковину.

Линька

У улитки нет периодической линьки: мягкое тело не сбрасывает кожу, а раковина постоянно растёт по краю устья. Отслаивание тканей, белый налёт, трещины, разрушение раковины или длительная неподвижность не являются нормальной линькой и требуют проверки влажности, кальция и осмотра ветеринарным врачом по экзотическим животным. Отделившиеся ткани и участки раковины не снимают руками.

Карантин и подселение

60 дней отдельно; виды не смешивать, грунт проверять на яйца.

Тревожные признаки

Глубокая ретракция, трещина, мягкая раковина, отёк, выпадение органов или отказ от корма.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен; эпифрагма означает ошибку условий.

Безопасность и особые риски

Падение, соль, пестициды, плесень и повреждение края раковины.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Kubiak, Giant African Land Snails, 2020 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. EAZA Bertia BPG, 2024 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. Conchological Society, Giant African Land Snails - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. исследование Archachatina marginata, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. MolluscaBase. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Западноафриканская улитка · версия 4