

Уход за амурским полозом

Амурский полоз

Особенности вида

Крупный активный лазающий полоз, приспособленный к холодной зиме и сезонной смене температур.

Размер

При вылуплении 25–40 см; взрослые самцы 140–180 см, самки 150–200 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный; зимой в природе впадает в длительный покой.

Ареал обитания

Российский Дальний Восток, северо-восток Китая и Корея; смешанные леса, речные долины и опушки умеренного муссонного климата.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтально-вертикальный. Корпус 90 × 45 × 55 см годится только временно по мере роста; для взрослой змеи ориентироваться на просторный террариум от 150 × 75 × 100 см, для крупной особи увеличивая длину по размеру тела; для особи длиннее 180 см комфортная длина террариума равна длине тела. Дверцы закрываются на замок; щели недопустимы. Приточные отверстия располагают внизу прохладной стороны, вытяжные – вверху тёплой. Молодь размещают в меньшем контейнере с последующей заменой либо в плотно оформленном взрослом объёме.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного по длине змеи размера и замок;
- Верхняя греющая лампа 50–75 Вт, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Два тесных укрытия и влажная камера;
- Субстрат, тяжёлая поилка-купалка, толстые ветви, полки, кора и лиственный опад;
- Светильник видимого дневного света и таймер.

Субстрат

Слой 8–12 см из органической почвы без удобрений, коры лиственных пород и сухого листового опада либо обеспыленной осиновой или тополевой стружки, включая лигноцел. Кокосовые чипсы и кокосовое волокно используют только в смеси с почвой, чтобы нижний слой удерживал влагу, а поверхность подсыхала. Буковая щепа подходит лишь крупной фракцией, без острых краёв и при кормлении с подложки. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик подходят для карантина и лечения, но не заменяют постоянный роящий слой. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия, влажная камера, толстые закреплённые ветви, полки и кора.

Активность и обогащение среды

Длинные лазательные маршруты, разные уровни, лиственный опад и безопасные запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая ёмкость, позволяющая полностью погрузиться; воду менять ежедневно.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 27–29 °С, воздух в прохладной зоне 18–22 °С, ночью 16–20 °С. Лампу устанавливают над одним краем, закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на высоте тела змеи у прогрева. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Температура выше 30 °С во всём объёме опасна; греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

50–70%; измерять цифровым гигрометром в средней части прохладной половины. Если показатель опустился ниже 50%, слегка опрыскать чистой водой прохладную четверть почвенного субстрата и лиственный опад либо увлажнить сфагнум во влажной камере. Прекратить после возвращения показателя в диапазон; поверхность должна подсыхать, а конденсат на стенках не должен сохраняться. Во влажной камере во время линьки поддерживать 70–80%. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Светильник видимого дневного света включать таймером на 14 часов летом, 10 часов зимой и 12 часов весной и осенью; ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Размороженные грызуны, перепела и суточные цыплята. До 300 г: 10–12% массы каждые 7 дней; 0,3–1 кг: 7–10% каждые 10–14 дней; более 1 кг: 5–7% каждые 14–21 день. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при разнообразных цельных кормовых объектах.

Вода

Свежая вода постоянно; купание добровольное.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Поддерживать всё тело; не брать 48 часов после кормления и во время линьки.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Для обычного содержания зимовка не обязательна; для разведения охлаждение 8–12 °C на 8–12 недель после подготовки и ветеринарного осмотра.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; постоянное совместное содержание не допускается.

Безопасность и особые риски

Плохо переносит постоянную жару; прохладная зона должна быть доступна круглосуточно.

Тревожные признаки

Дыхательные шумы, выделения, потеря массы, рвота, ожог, клещи, неполная линька или длительная вялость вне периода покоя.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Ананьева Н. Б. и др., Атлас пресмыкающихся Северной Евразии, 2004 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Herpeton Academy, Elaphe schrenckii Care Guide, ред. 2026 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. ReptiCare, Amur Rat Snake, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Langeveld M., Captive care and breeding of Elaphe schrenckii, Litteratura Serpentina 14(5), 1994 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Амурский полоз · версия 5